

Toelatingen in de teelt van aardbeien

De onderstaande gegevens zijn zorgvuldig samengesteld (februari 2026). De opsteller is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onvolledigheden. Raadpleeg voor gebruik altijd de meest recente etikettekst (www.ctgb.nl) of uw voorlichter. Let op beperkingen in gebruik van middelen (o.a. langs watergangen, aantal bespuitingen, etc.)

TOELATINGEN IN DE TEELT VAN AARDBEIEN 2026

Plaag/ziekte	Middelen	Werkzame stof	Dosering	V.T.*	Opmerkingen
Aaltjes	Nemguard DE	Knoflookextract	20-60 kg	7	Alleen voor de buitenteelten, ook voor HKF, voor of na planten toepasbaar
Bladluizen	Pirimor*** (Einde 2026)	pirimicarb	30 – 60 gr/ 100 ltr	3	Onbedekte teelt 2x per 12 maanden max. 0,3 kg/ha, bedekte teelt 2x per 12 maanden max. 0,6 kg/ha, 7 dagen interval tussen de toepassingen Uitverkoop 15-9-2026 en opgebruik 31-12-2026
	Flipper Plus	Vetzuren en kaliumzouten	16 ltr/ ha	1	Alleen toegelaten in de bedekte teelt. Maximaal 5 toepassingen met 7 dagen interval. Ook werking op spint en witte vlieg. Met 300 tot 1000 ltr toepassen.
	Sivanto Prime	flupyradifurone	0,5 ltr / ha	3	Alleen toegelaten in de bedekte teelt. In substraat 2 toepassingen mogelijk en bij een teelt in de grond 1 toepassing.
	Oikos	Azadirachtin	1,5 ltr / ha	7	Alleen toegelaten in de bedekte teelt op substraat. Maximaal 4 toepassingen, met 7 dagen interval toegelaten. Ook werking op trips en witte vlieg.
	Azatin	Azadirachtin	1,5 ltr / ha	7	Alleen toegelaten in de bedekte teelt op substraat. Maximaal 3 toepassingen, met 7 dagen interval toegelaten. Ook werking op trips en witte vlieg.
	Oroganic	Sinaasappelolie	4 ltr/ha	1	Alleen toegelaten in de bedekte teelt. Maximaal 20 toepassingen, met 7 dagen interval toegelaten. Ook werking op meeldauw, spint, trips en witte vlieg.
	Gazelle	acetamiprid	250 gr/ ha	-	Alleen toegelaten voor de vermeerderingsteelt, maximaal 1 toepassing per seizoen
	Teppeki (Afinto)	flonicamid	140 gr/ ha	3	Alleen toegelaten onbedekte teelt , maximaal 2 toepassingen met 7 dagen interval. Niet in de bloei! In de bloei alleen toepassen tussen zonsondergang en zonsopkomst.
	Mavrik	tau-fluvalinaat	0,3 ltr/ ha	7	Alleen toegelaten onbedekte teelt , maximaal 2 toepassingen met 14 dagen interval per teelt. Toepassen met DRT 95 en 75 cm teeltvrij. Opletten met natuurlijke vijanden!
Rupsen	Decis Protech	deltamethrin	0,2 – 0,33 ltr /ha	3	Schadelijk voor natuurlijke vijanden. Toepasbaar tot de bloei!! Maximaal 2 toepassingen per jaar met 14 dagen interval, onbedekt 0,2 liter en bedekt 0,33 liter per hectare. Protech is de opvolger van Decis Ec
	Tracer	spinosad	15 ml/ 100 ltr	1	Bedekt en onbedekt toegelaten. Maximaal 3x keer per jaar met 7 dagen interval. Werkt ook op trips en Suzuki. <i>Niet toegelaten in grondwaterbeschermingsgebieden.</i>
	Proclaim	emamectin benzoaat	1,5 kg/ha	3	Alleen toegelaten voor de bedekte teelt. Maximaal 3x per jaar met 7 dagen interval, werkt ook zeer goed op Suzuki. Niet toepassen op bloeiende gewassen!
	Xentari	Bacillus thuringiensis, subsp. Aizawai	100 gr/ 100 ltr	-	Voor optimale werking toepassen bij warm weer op kleine rupsen, eventueel herhalen, maximaal 8 toepassingen

	Turex	Bacillus thuringiensis, subsp. Aizawai	50 gr/ 100 ltr	-	Voor optimale werking toepassen bij warm weer op kleine rupsen, eventueel herhalen, maximaal 3 toepassingen
	Lepinox plus	Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki	100 gr/ 100 ltr	-	Voor optimale werking toepassen bij warm weer op kleine rupsen, eventueel herhalen. Maximaal 3 toepassingen per teeltcyclus
	Dipel DF	Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki	100 gr/ 100 ltr	-	Voor optimale werking toepassen bij warm weer op kleine rupsen, eventueel herhalen, maximaal 8 toepassingen
	Costar	Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki SA-12	100 gr/ 100 ltr	-	Voor optimale werking toepassen bij warm weer op kleine rupsen, eventueel herhalen, maximaal 6 toepassingen
	Florbac	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai	100 gr/ 100 ltr		Voor optimale werking spuiten bij warm weer op kleine rupsen, eventueel herhalen, maximaal 8 toepassingen, onbedekt 6 dagen interval, bedekt 5 dagen interval
Spintmijten	Nissorun vlb.	hexythiazox	20 ml/ 100 ltr	3	Eventueel in de bloei te gebruiken, max. 1 toepassing per teeltcyclus
	Milbeknock	milbemectine	50 ml/100 ltr	—	Alleen onbedekte teelt, alleen tot bloei en na de oogst en in vermeerderingsvelden, negatieve effecten op biologie en bestuivers, (bepalingen langs watergangen). Maximaal 2 toepassingen per 12 maanden. Minimaal 75% DRT bij 1,5 mtr teeltvrije zone en 90% DRT bij 1 mtr teeltvrije zone!
	Vertimec Gold	abamectine	0,5 ltr/ ha	3	Alleen toegelaten voor de bedekte teelt! Niet toepassen in de bloei en max. 3 toepassingen per 12 maanden, met een interval van 7 dagen. Werkt ook op trips.
	Scelta	cyflumetofen	1 ltr/ ha	1	Alleen toegelaten in de bedekte teelt op substraat, max. 2 toepassingen per teelt
	Floramite	bifenazate	40 ml/ 100 ltr	1	Toegelaten voor de bedekte opkweek en vermeerdering van aardbeien. Maximaal 4 toepassingen per jaar en 2 toepassingen per blok
Nieuw in 2026	Cantack	acequinocyl	100 ml / 100 ltr	—	Alleen toegelaten voor de onbedekte opkweek en vermeerderingsteelt
	Naturalis-L	Beauveria bassiana ATCC74040	0,75 – 1 ltr/ha	-	Maximaal 15 toepassingen met 5 dagen interval. Geen veiligheidstermijn, bij voorkeur toepassen met de uitvloeier Heliosol. Werkt ook op witte vlieg en trips
	Lalguard M52 OD	Metarhizium anisopliae var. anisopliae stam BIPESCO 5/F52	1,2 ltr/ha (max 2 liter)	4 uur	Bedekte teelt , maximaal 10 toepassingen per 12 maanden met 3 dagen interval en maximaal 2 ltr/ha. Onbedekte teelt , maximaal 6 toepassingen per 12 maanden met 7 dagen interval en maximaal 1,25 ltr/ha. Werkt ook op trips en nevenwerking op witte vlieg.
	Flipper Plus	Vetzuren en kaliumzouten	16 ltr/ ha	1	Alleen toegelaten in de bedekte teelt. Maximaal 5 toepassingen met 7 dagen interval. Ook werking op spint en witte vlieg. Met 300 tot 1000 ltr toepassen.
	Orogran	Sinaasappelolie	4 ltr/ha	1	Alleen toegelaten in de bedekte teelt. Maximaal 20 toepassingen, met 7 dagen interval toegelaten. Ook werking op bladluizen, meeldauw, trips en witte vlieg.
Wantsen					In de opkweek de nevenwerking van Gazelle benutten. In de bedekte teelt de nevenwerking van Sivanto benutten. Hang desnoods witte kruisvallen op. In ieder geval om de vlucht te monitoren!
Suzuki Fruitvlieg	Tracer	spinosad	15 ml/ 100 ltr	1	Bedekt en onbedekt toegelaten. Maximaal 3x keer per jaar met 7 dagen interval. Werkt ook op trips en rupsen. <i>Niet toegelaten in grondwaterbeschermingsgebieden.</i>
	Benevia	cyantraniliprole	0,75 ltr/ ha	1	Max. 2x per seizoen met 7 dagen interval. Bedekt en onbedekt toegelaten.

	Proclaim	emamectin benzoaat	1,5 kg/ha	3	Alleen toegelaten voor de bedekte teelt. Maximaal 3x per jaar met 7 dagen interval. Niet toepassen op bloeiende gewassen!
	Mavrik	tau-fluvalinaat	0,3 ltr/ ha	7	Alleen toegelaten onbedekte teelt, maximaal 2 toepassingen met 14 dagen interval per teelt. Toepassen met DRT 95 en 75 cm teeltvrij. Opletten met natuurlijke vijanden!
Nieuw in 2026	Minecto One	cyantraniliprole	0,13 kg/ ha	1	Maximaal 1x per 3 jaar toegelaten! Alleen toegelaten voor de onbedekte teelt. Niet in grondwaterbeschermingsgebieden. Toepassen met DRT 97,5 en 150 cm teeltvrij.
Kevers o.a. aardbei bloesemkever	Decis Protech	deltamethrin	0,2 – 0,33 ltr /ha	3	Schadelijk voor natuurlijke vijanden. Toepasbaar tot de bloei!! Max. 2 toepassingen per jaar met 14 dagen interval, onbedekt 0,2 liter en bedekt 0,33 liter per hectare.
	Benevia	cyantraniliprole	0,75 ltr/ ha	1	Maximaal 2 toepassingen per seizoen. Nevenwerking op trips en witte vlieg.
Witte vlieg / Trips	Verimark	cyantraniliprole	0,375 ltr/ ha	1	Alleen bedekte teelt. Is een druppeltoepassing. Maximaal 4 toepassingen per seizoen met 7 dagen interval. Nevenwerking op bladluis. <i>Dit is dezelfde werkzame stof als in Benevia, kies 1 van beide producten om resistentie te beperken!!</i>
	Botanigard Vloeibaar	Beauveria bassiana stam GHA	125 ml/ 100 ltr	–	Alleen bedekte teelt. Biologisch schimmelproduct tegen witte vlieg en trips, niet in de bloei. Max. 12x per seizoen met 5 dagen interval
	Botanigard WP	Beauveria bassiana stam GHA	62,5 gr/ 100 ltr	–	Alle teelten. Biologisch schimmelproduct tegen witte vlieg en trips, niet in de bloei. Max. 12x per seizoen
	Velifer	Beauveria bassiana PPRI 5339	125 ml/ 100 ltr	–	Alleen bedekte teelt. Biologisch schimmelproduct tegen witte vlieg en trips; aardbei bedekte teelten, bij voorkeur niet in de bloei. Max. 73x per jaar met 5 dagen interval
	PreFeRal	Isaria fumosorosea Apopka stam 97	100 gr/ 100 ltr	–	Biologisch schimmelproduct tegen witte vlieg en trips; aardbei bedekte teelten, niet in de bloei. Max. 12x per seizoen
	Futureco Nofly WP	Paecilomyces fumosoroseus stam Fe9901	2,5 kg / ha	–	Alleen bedekte teelt. Groen product tegen witte vlieg en trips. Max. 4x per jaar met 5 dagen interval. Dit middel niet mengen, dus solo toepassen!!
	Vertimec Gold	abamectine	0,5 ltr/ ha	3	Alleen toegelaten voor de bedekte teelt! Niet toepassen in de bloei en maximaal 3 toepassingen per 12 maanden, met een interval van 7 dagen. Werkt ook op spint.
	Decis Protech	deltamethrin	0,2 – 0,33 ltr /ha	3	Schadelijk voor natuurlijke vijanden. Toepasbaar tot de bloei!! Max. 2 toepassingen per jaar met 14 dagen interval, onbedekt 0,2 liter en bedekt 0,33 liter per hectare.
	Tracer	spinosad	15 ml/ 100 ltr	1	Bedekt en onbedekt toegelaten. Maximaal 3x keer per jaar met 7 dagen interval. Werkt ook op rupsen en Suzuki. <i>Niet toegelaten in grondwaterbeschermingsgebieden.</i>
	Sivanto Prime	flupyradifurone	0,625 ltr / ha	3	Alleen toegelaten in de bedekte teelt. In substraat 2 toepassingen mogelijk en bij een teelt in de grond 1 toepassing. Nevenwerking op kevers!
	ER II	maltodextrine	2,5 ltr / 100 ltr	1	Niet kort voor de oogst toepassen. Maximaal 20 toepassingen met 3 dagen interval
	Eradicoat Max	maltodextrine	20 ltr /ha (max. 24 ltr)	-	Bedekte teelt: 40 toepassingen met 3 dagen interval Onbedekte teelt: 5 toepassingen met 3 dagen interval
	Mycotal	Lecanicillium muscarium stam Ve6	100 gr / 100 ltr	1	Biologisch insecticide, alleen toegelaten voor de bedekte teelt. Maximaal 12 toepassingen met 7 dagen interval.
	Oikos	Azadirachtin	0,1 - 0,15 ltr / ha	7	Alleen toegelaten in de bedekte teelt op substraat. Maximaal 4 toepassingen, met 7 dagen interval toegelaten. Ook werking op bladluizen.
	Azatin	Azadirachtin	1,5 ltr / ha	7	Alleen toegelaten in de bedekte teelt op substraat. Maximaal 3 toepassingen, met 7 dagen interval toegelaten. Ook werking op bladluizen.

	Oroganic	Sinaasappelolie	4 ltr/ha	1	Alleen toegelaten in de bedekte teelt. Maximaal 20 toepassingen, met 7 dagen interval toegelaten. Ook werking op bladluiz, meeldauw en spint.
	Naturalis-L	Beauveria bassiana ATCC74040	0,75 – 1 ltr/ha	-	Maximaal 15 toepassingen met 5 dagen interval. Geen veiligheidstermijn, bij voorkeur toepassen met de uitvloeier Heliosol. Toegelaten tegen spint.
	Winner	formetanaat	30 gr / 100 ltr 60 gr / 100 ltr	-	Alleen na-oogst toepassing! Lage dosering 4x met 7 dagen interval. Hoge dosering maximaal 1x. Alleen toepassen middels automatische spuitapparatuur!!
	Siltac SF (Protac)	siliconenpolymeren	0,6 ltr/ha	-	Het middel heeft geen etiket. De 0,6 liter toepassen in 500 liter water
	Stix	siliconenpolymeren	1 – 1,5 ltr/ha	-	Opletten met bladverbranding, altijd een proefbespuiting uitvoeren, bij voorkeur toepassen met 500 liter per hectare. De maximale dosering is 0,3%.
Meeldauw	Stroby WG	kresoxim-methyl	0,3 kg/ ha	7	Maximaal 2 toepassingen (nevenwerking botrytis/colletotrichem), werking preventief
	Kumulus s	spuitzwavel	400 gr/ 100 ltr	—	Alleen voor- en naooogst, maximaal 6 toepassingen, alleen bedekte teelt
	Thiovit Jet	spuitzwavel	400 gr/ 100 ltr		Alleen voor- en naooogst, maximaal 4 toepassingen, alleen bedekte teelt
	Topaz 100 EC	penconazool	0,5 ltr / ha	3	Bedekte teelt, maximaal 4 toepassingen, onbedekte teelt maximaal 2 toepassingen
	Nimrod 250 EC	bupirimaat	1 ltr/ ha	3	Maximaal 4 toepassingen, toegelaten onbedekte teelt van aardbei
	Abir	bupirimaat	1 ltr/ ha	3	Maximaal 4 toepassingen, toegelaten bedekte teelt van aardbei
	Flint	trifloxystrobin	125 gr/ ha	3	Maximaal 3 toepassingen, toegelaten alle aardbeien
	Takumi	cyflufenamid	0,15 ltr / ha	3	Maximaal 2 toepassingen met 7 dagen interval, toegelaten alle aardbeien
	Vacciplant	Laminarine	0,75 ltr/ ha	-	Maximaal 7 toepassingen, toegelaten alle aardbeien
	Vivando	Metrafenon	0,3 ltr/ ha	3	Maximaal 2 toepassingen, toegelaten alleen in de bedekte teelt, werking preventief
	Luna Privilege	Fluopyram	50 ml/ 100 ltr	1	Maximaal 2 toepassingen, toegelaten alleen in de bedekte teelt, werking preventief
Einde 2026	Luna Sensation	Fluopyram + Trifloxystrobin	0,8 ltr/ ha	1	Maximaal 2 toepassingen, toegelaten alleen in de onbedekte teelt Uitverkoop: 30-1-2026 en opgebruik 30-7-2026
	Amistar	Azoxystrobin	1 ltr/ ha	3	Maximaal 3 toepassingen, toegelaten alle teelten
	Amistar Top	Azoxystrobin + Difenconazool	1 ltr/ ha	3	Maximaal 2 toepassingen, toegelaten in de onbedekte teelt, ook werking op vruchtrot
	Bifasto	Difenconazool + fluxapyroxad	0,6 ltr/ ha	1	Maximaal 3 toepassingen, toegelaten alle teelten, ook werking op vruchtrot
	Serenade	Bacillus amyloliquefaciens stam QST 713	8 ltr/ ha	-	Maximaal 6 toepassingen met een interval van 5 dagen. Alle aardbeien en geen VT.
	Sonata	Bacillus pumilus QST 2808	10 ltr/ ha	1	Biologisch fungicide. Werkt vooral op meeldauw. Maximaal 6 toepassingen met een interval van 5 dagen. Toepassen met een uitvloeier.
	Karma	Kaliumwaterstof-carbonaat	3 kg/ ha	1	Maximaal 8 toepassingen, toegelaten alle aardbeien, 7 daags interval tussen de bespuitingen aanhouden.
	VitiSan	Kaliumwaterstof-carbonaat	5 kg/ha	1	Maximaal 6 toepassingen, toegelaten alle aardbeien, 5 daags interval tussen de bespuitingen aanhouden.
	AQ 10	ampelomyces quisqualis stam AQ 10	35 – 70 gr/ ha	-	Biologische meeldauwbestrijder, alleen bedekte teelt. Aansluitend twee behandelingen uitvoeren met een interval van 7 a 10 dagen.
	Fado	Cos-oga	Bedekt is 4 ltr/ha Onbedekt 2 ltr/ha	-	Bedekte teelt , max 5 toepassingen per teeltseizoen, met 7 dagen interval Onbedekte teelt, max 8 toepassingen per jaar, met 8 dagen interval en 3 dagen VT

	Limocide	Sinaasappelolie	3 ltr/ha	-	Alleen toegelaten in de bedekte teelt. Maximaal 6 toepassingen per jaar, met 7 dagen interval toegelaten. Ook werking op spint, trips en witte vlieg.
Vruchtrot (o.a. Botrytis)	Luna Privilege	Fluopyram	50 ml/ 100 ltr	1	Maximaal 2 toepassingen, toegelaten alleen in de bedekte teelt
Einde 2026	Luna Sensation	Fluopyram + Trifloxystrobin	0,8 ltr/ ha	1	Maximaal 2 toepassingen, toegelaten alleen in de onbedekte teelt Uitverkoop: 30-1-2026 en opgebruik 30-7-2026
	Teldor	fenhexamid	1 - 1,5 kg/ ha	1	Toegelaten voor alle aardbeien, maximaal 3 toepassingen met 7 dagen interval, bedekte teelt max. 1,2 kg/ha en onbedekt 1,5 kg/ha
	Scala	pyrimethanil	2 ltr/ ha	3	Maximaal 2 toepassingen per teeltseizoen met interval van 21 dagen, alleen grondgebonden onbedekte teelt
	Pyrus	pyrimethanil	2 ltr/ ha	3	Maximaal 2 toepassingen per teeltseizoen met interval van 7 dagen
	Signum	pyraclostrobin + boscalid	1,8 kg/ ha	1	Maximaal 2 toepassingen per jaar. Heeft nevenwerking op meeldauw
	Switch	fludioxonil + cyprodinil	100 gr/ 100 ltr	3	In percelen die grenzen aan watergangen een 75% driftreducerende dop gebruiken, maximaal 3 toepassingen per jaar
Einde 2026	Prolectus	Fenpyrazamine	1,2 kg/ ha	1	Maximaal 3 toepassingen per jaar, toegelaten bedekte en onbedekte teelt, 7 daags interval. Uitverkoop 15 juli 2025 en opgebruik is 15 juli 2026
	Geoxe/ Safir	Fludioxonil	0,5 kg/ ha	3	Max. 2 toepassingen met 10 dagen interval, alleen toegelaten in de onbedekte teelt
	Kenja	Isofetamid	1,2 ltr/ha	1	Maximaal 2 toepassingen met 7 dagen interval (alle teelten)
	Serenade	Bacillus amyloliquefaciens stam QST 713	8 ltr/ ha	-	Maximaal 6 toepassingen met een interval van 5 dagen. Alle aardbeien en geen VT.
	Serifel	Bacillus amyloliquefaciens stam SBI 600	0,5 kg/ ha	-	Maximaal 12 toepassingen per 12 maanden met een interval van 5 dagen. Zowel de onbedekte als bedekte teelt van aardbeien en geen VT.
	Taegro	Bacillus amyloliquefaciens stam FZb 24	0,37 kg/ ha	4 uur	Maximaal 12 toepassingen per teeltcyclus met een interval van 3 dagen.
	Amylo-X WG	Bacillus amyloliquefaciens subsp. Plantarum D747	2,5 kg/ ha	1	Biologisch fungicide, bruikbaar als bedekkingsfungicide. Maximaal 6 toepassingen met een interval van 7 dagen. Nevenwerking op meeldauw.
	Prestop 4B	Gliocladium catenulatum stam J1446	5 – 10 gr Flying Doctor systeem	-	Maximaal 25 toepassingen per teeltcyclus. Nuttige schimmel welke verspreidt wordt middels hommels, via het Flying Doctor systeem op de hommelkasten van Biobest. 1 – 2 hommelkasten per 1000 m²
	Botector	Aureobasidium pullulans DSM 14940 en 14941	1 kg /ha	1	Toegelaten voor vollegrond en de bedekte teelt. Maximaal 6 toepassingen, maar zonder interval. Toepasbaar kort voor de oogst om kleine wondjes af te dekken. Mag ook in de opkweek van aardbeien!
	Polyversum	Pythium oligandrum stam M1	0,1 kg/ha	-	Alleen onbedekte teelt. Maximaal 8 toepassingen met 5 dagen interval. Geen veiligheidstermijn! Werkt ook tegen stengelbasisrot.
	Vintec	Trichoderma atroviride strain SC1	0,2 kg/ha	-	Alleen onbedekte teelt. Maximaal 6 toepassingen met 5 dagen interval. Geen veiligheidstermijn.
	Problad	Extract van Lupinus albus	3,2 ltr/ha	-	Alle teelten. Maximaal 6 toepassingen met 8 dagen interval. Geen veiligheidstermijn.

	Lalstop G46 WG	Clonostachys rosea stam J1446	0,3 – 1 kg/ha	-	Bedekt is 2 toepassingen met 1 kg/ha en 21 dagen interval Onbedekt is 4 toepassingen met 0,3 kg/ha en 6 dagen interval
Nieuw etiket	Captan korrel (o.a Merpan & Malvin)	captan	0,9 – 1,8 kg/ha	14	Bedekte teelt. Maximaal 2 toepassingen met 1,8 kg/ha en 10 dagen interval. Onbedekte teelt. Maximaal 2 toepassingen met 0,9 kg/ha en 10 dagen interval.
Nieuw etiket	Captan vloeibaar (o.a. Merpan flowable)	captan	1,5 – 3 ltr/ha	14	Bedekte teelt. Maximaal 2 toepassingen met 3 ltr/ha en 10 dagen interval. Onbedekte teelt. Maximaal 2 toepassingen met 1,5 ltr/ha en 10 dagen interval.
Stengelbasisrot / roodwortelrot	Aliette	fosetyl-aluminium	Dompelen 0,25% (250 gr/ 100 ltr)	14	Dompelbehandeling, maximaal 10 kg/ha. Alleen toegelaten voor de onbedekte teelt van aardbeien. Handmatig dompelen is niet toegelaten. Maximaal 3 toepassingen.
			75 gr/ are in 10 ltr water	14	Dit is de dosering voor een rijenbehandeling na planten. Vermeerdering is maximaal 1 toepassing.
(Pestalotiopsis)	Banjo	fluazinam	0,2 ltr/ha	-	Alleen toegelaten voor de onbedekte vermeerdering! Maximaal 3 toepassingen per seizoen met 14 dagen interval. DRT eis is 90% en uitsluitend neerwaarts toepassen.
	Pergado V	mandipropamid	0,6 ltr/ha	-	Alleen toegelaten voor de vermeerdering! Maximaal 4 toepassingen met 14 dagen interval
	Previcur Energy	Propamocarb en fosetyl	Dompelen 0,3% (300 ml/100 ltr)	-	Alleen toegelaten voor de vermeerdering! Dompelen maximaal 3 ltr per hectare. Bij een gewasbehandeling maximaal 2x 1,5 liter per hectare.
			Aangieten (2,36 ltr / ha)	-	
	Proplant	propamocarb hydrochloride	150 – 300 ml / 100 liter	-	Alleen toegelaten voor de vermeerdering! Lees voor de correcte doseringen het etiket!
	Polyversum	Pythium oligandrum stam M1	0,2 kg/ha	-	Alleen onbedekte teelt. Eenmalige behandeling middels aangieten of rijenbehandeling. Geen veiligheidstermijn! Ook inzetbaar tegen vruchtrot.
	Lalstop G46 WG	Clonostachys rosea stam J1446	25 gr/ 1000 planten	-	Aangieten of verspuiten op de grond na verplanten.
	Frutogard	Algenextract, kalifosfonaat en aminozuren	4,5 ltr/ha		Alleen toegelaten voor de vermeerdering! Maximaal 4 toepassingen met 7 dagen interval
Groeibehersing	Regalis Plus	prohexadion-calcium	0,6 – 1,5 kg/ha	-	Maximaal 5 toepassingen met 0,6 kg/ha met 10 dagen interval Per 12 maanden maximaal 3 kg/ha toepassen en maximaal 1,5 kg/ha per toepassing
Onkruidbestrijding aardbeien:	Agil 100 EC	Propaquizafob	0,75 – 1,5 ltr/ ha	35	Alleen onbedekte teelt, maximaal 1,5 liter per hectare per jaar toepassen
	AZ 500	Isoxaben	0,4 ltr/ha	-	Alleen onbedekte teelt, maximaal 1 toepassing per 12 maanden, lange nawerking
	Quickdown	pyraflufen-ethyl	0,8 ltr/ ha	—	Alleen toegelaten binnen de onbedekte teelt. Max. 2 toepassingen per seizoen, met 21 dagen interval. Voeg 1 liter Minerale- of onkruidolie per hectare toe.
	Devrinol 45 SC	napropamide	1 ltr/ ha	—	Alleen onbedekte teelt. Maximaal 2 toepassingen met 7 dagen interval
	Kontakt 320 SC	fenmedifam	3 ltr / ha	—	In vollegrondsteelten voor de bloei of na de oogst, max. 3 ltr per hectare, maximaal 1 toepassing
	Asterix EC	fenmedifam	6 ltr / ha	—	In vollegrondsteelten voor de bloei of na de oogst, max. 6 ltr per hectare, maximaal 1 toepassing

	Corzal	fenmedifam	6 ltr / ha	14_21	In vollegrondsteelten voor de bloei of na de oogst, max. 6 ltr per hectare, maximaal 1 toepassing
	Corzal SE	fenmedifam	0,5 – 3 ltr / ha	14_21	In vollegrondsteelten voor de bloei of na de oogst, maximaal 12 toepassingen (max. 8 ltr per ha per 12 maanden)
	Oblix 500 SC	ethofumesaat	0,2 – 0,6 ltr / ha	–	Alleen voor de onbedekte opkweek- en vermeerderingsvelden , maximaal 2 toepassingen met 0,6 liter per ha, met 10 dagen interval. Of maximaal 8 toepassingen met 0,2 liter per hectare, met 7 dagen interval. Maximaal 1,6 liter per teeltcyclus
	Dual Gold	s-metolachloor	0,7 ltr / ha	28	Bodemherbicide, toepassen na uitplanten, maximaal 2 toepassingen. Niet op zandgronden en in grondwaterbeschermingsgebieden
	Goltix WG	metamitron	0,5 – 1 kg / ha	–	Maximaal 3 toepassingen per teelt met 10 dagen interval. Maximaal 3 kg per seizoen
	Bettix SC	metamitron	0,5 – 1 ltr / ha	–	Alleen voor vermeerderingsvelden , maximaal 3 toepassingen per teelt met 10 dagen interval. Maximaal 2 liter per teeltseizoen
	Lontrel 100	clopyralid	0,5 of 1 ltr / ha		Alleen onbedekte teelt. Vanaf gewasstadium BBCH 15 mag met een interval van 7 dagen 0,5 ltr toegepast worden. Na de oogst mag 1 ltr per ha. Uitverkoop is 3-6-2026 en opgebruik is 3-8-2026
	Pilot en Targa Prestige	quizalofop-P-ethyl	1 ltr / ha	21	's Avonds spuiten op een droog gewas, geen uitvloeier toevoegen. Minimaal 400 liter water. Tegen graansopslag, maximaal 1x per seizoen. Alleen toegelaten voor de onbedekte vermeerderingsteelt
	Centurion Plus	clethodim	2 ltr/ ha	30	Alleen grassen en alleen toegelaten binnen de onbedekte teelt. Maximaal 1 toepassing per seizoen
	Focus Plus	Cycloxydim	2 ltr/ ha	42	Alleen grassen en alleen toegelaten binnen de onbedekte teelt. Maximaal 1 toepassing per seizoen

Geïntegreerde gewasbescherming (biologische bestrijding):

De laatste jaren worden goede ervaringen opgedaan met de biologische bestrijding van diverse plagen in de teelt van kleinfruit en aardbeien. Omdat een aantal van genoemde middelen schadelijk zijn voor (uitgezette) natuurlijke vijanden mogen deze niet of slechts beperkt (voor uitzetten of pleks gewijs) ingezet worden.

Bijvoorbeeld veel gebruikte roofmijtsoorten zijn (tegen met name trips) *Amblyseius cucumeris* en *Amblydromalus limonicus*

Opmerkingen:

- B* = beperkingen op etiket ten aanzien van gebruik langs bijvoorbeeld watergangen, moment van toepassing, maximale dosering, etc.
Lees voor gebruik het etiket of overleg met uw voorlichter
- VT* = veiligheidstermijn in dagen.
- Let bij het middel Pirimor op met het zogenaamde "Re- entry". Zie voor etiketten: www.fytostat.nl of www.ctgb.nl, of overleg met uw voorlichter
- *** **Middelen met deze vermelding mogen binnen de bedekte teelt alleen gebruikt worden als bedrijven kunnen voldoen aan de toepassingsvoorwaarden welke er gelden voor waterzuivering. Lees voor gebruik kritisch de etiketten!!**