

Toelatingen in de teelt van pruim

De onderstaande gegevens zijn zorgvuldig samengesteld (januari 2024). De opsteller is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onvolledigheden. Raadpleeg voor gebruik altijd de meest recente etikettekst (www.ctqb.nl) of uw voorlichter. Let op beperkingen in gebruik van middelen (o.a. langs watergangen, aantal bespuitingen, etc.)

TOELATINGEN IN DE TEELT VAN PRUIM 2024

Plaag / ziekte	Middel	Dosering per hectare	VT* (dg)	Actieve stof	Opmerkingen	B*
Bladluizen	Pirimor 5794 N (W.12)	0,5 kg	7	pirimicarb	2 toepassingen met 7 dagen interval. Te gebruiken in de bloei. Door driftbeperkingen bij watergangen nauwelijks bruikbaar. Niet toegelaten binnen de bedekte teelt Uitverkoop maart 2025 en opgebruik juni 2025	B
	Movento 13404 N (W.7)	0,5 ltr (max. 0,75 ltr)	21	spirotramat	<i>Niet toepassen op bloeiende gewassen. Niet toegelaten in de bedekte teelt.</i> Trage aanvangswerking! <i>Let op met drifteisen voor alle percelen, 95% DRT, met 4,5 meter teeltvrij.</i> Uitverkoop 30-10-2024 en opgebruik 30-10-2025	B
	Batavia 15615 (W.6)	0,75 ltr (max. 1,1 ltr)	21	spirotramat	<i>Niet toepassen op bloeiende gewassen. Niet toegelaten in de bedekte teelt.</i> Trage aanvangswerking! Een SC formulering. Uitverkoop 30-10-2024 en opgebruik 30-10-2025	
	Teppeki 12757 (W.12)	140 gram	21	flonicamid	<i>Niet toepassen op bloeiende gewassen, dan alleen na zonsondergang toepassen. Niet toegelaten in de bedekte teelt.</i> Max. 2 toepassingen per seizoen, met 21 dagen interval	
	Afinto 16104 (W.3)	140 gram	14	flonicamid	Zie Tepeki, zelfde werkzame stof, alleen andere fabrikant	
	NeemAzal-T/S 12455 (W.6)	2 – 3 liter (max. 3 – 4,5 ltr)	-	azadirachtin	<i>Niet toepassen op bloeiende gewassen. Alleen toegelaten voor de onbedekte teelt.</i> Toepassen met DRT 99 en 450 cm teeltvrij. Voor 1 mei max. 3 ltr/ha, na 1 mei max. 4,5 ltr/ha toepassen. Max. 3 toepassingen per seizoen, met 7 dagen interval <i>In grondwaterbeschermingsgebieden verboden tussen 1-9 en 1-3</i>	B
Groene appelwants	Promanal HP 16278 N (W.-)	20 ltr (max. 30 ltr)	-	Paraffineoliën	Alle teelten. Toepassen vroege voorjaar, 1 toepassing per jaar toegelaten, op steenfruit de maximale dosering gebruiken. <i>Let op met drifteisen. Of met DRT 95, met 4,5 meter teeltvrij of DRT 97,5 bij kleiner dan 4,5 teeltvrij</i>	B
	Ovitex 16431 N (W.-)	20 ltr (max. 30 ltr)	-	Paraffineoliën	Alleen onbedekte teelt. Toepassen vroege voorjaar, 1 toepassing per jaar toegelaten, op steenfruit de maximale dosering gebruiken. <i>Let op met drifteisen. DRT 99, met 4,5 meter teeltvrij</i>	B

Pruimenzaagwesp					Geen middelen toegelaten. Hopelijk weer een vrijstelling voor Gazelle!	
Rupsen en motten	Coragen 13555 N (W.3)	175 ml	14	chlorantraniliprole	Maximaal twee toepassingen per seizoen, met een interval van 14 dagen. Niet toegelaten in de bedekte teelt!	B
	XenTari WG 12437 N (W.4)	1 kg (max 1,5 kg)	-	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai	Alleen onbedekte teelt , 10 toepassingen met 6 dagen interval.	B
	Dipel DF 14674 N (W.1)	1,5 kg	-	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Op het etiket: steenfruit breed toegelaten Maximaal 8 toepassingen met 6 dagen interval, geen VT	
	Costar WG 15885 N (W.1)	0,3 – 1 kg	-	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Op het etiket: steenfruit breed toegelaten Maximaal 6 toepassingen met 7 dagen interval, geen VT	
	NeemAzal-T/S 12455 (W.6)	2 – 3 liter (max. 3 – 4,5 ltr)	-	azadirachtin	<i>Niet toepassen op bloeiende gewassen. Alleen toegelaten voor de onbedekte teelt.</i> Toepassen met DRT 99 en 450 cm teeltvrij. Voor 1 mei max. 3 ltr/ha, na 1 mei max. 4,5 ltr/ha toepassen. Max. 3 toepassingen per seizoen, met 7 dagen interval <i>In grondwaterbeschermingsgebieden verboden tussen 1-9 en 1-3</i>	B
Spint – en roestmijten	Cantack 12939 N (W.5)	0,9 ltr	21	acequinocyl	Maximaal 1 toepassing per seizoen, alleen toegelaten voor de onbedekte teelt , toepassen met minimaal 90% DRT!	B
	Scelta 13440 (W.7)	1 ltr	-	cyflumetofen	Toegelaten na de oogst, zowel voor de bedekte en onbedekte teelt , maximaal 2 toepassingen met 7 dagen interval	B
	Vertimec Gold 13087 N (W.9)	0,75 ltr (max. 1,1 ltr)	28	abamectine	Alleen toegelaten voor de bedekte teelt! Het middel niet vaker dan <u>twee keer</u> , per teeltcyclus toepassen. Het minimale interval is 10 dagen.	B
	Botanigard WP 12612 (W.4)	0,625 kg	1	Beauveria bassiana	Maximaal 25 toepassingen met een interval van 5 dagen. Alleen toegelaten voor de onbedekte teelt , werkt ook op trips	
	Botanigard Vlb. 12612 (W.4)	1,25 ltr	1	Beauveria bassiana	Max. 25 toepassingen met een interval van 5 dagen. Alleen toegelaten voor de onbedekte teelt , werkt ook op trips	
	Futureco Nofly WP 16266 (W.4)	2,5 kg	1	Paecilomyces fumosoroseus stam Fe9901	Alleen toegelaten in de bedekte teelt. Max. 4 toepassingen per seizoen, met 5 dagen interval. Op het etiket staat tegen Witte vlieg en Trips.	
	Oroganic 15958 (W.2)	8 ltr	1	Sinaasappelolie	Alleen toegelaten in de bedekte teelt. Max. 11 toepassingen per seizoen, met 7 dagen interval. Werkt ook op bladluis en meeldauw	
	Neudosan 16452 (W.-)	14 ltr	-	vetzuren en kaliumzouten	Groen middel, alleen toegelaten voor de onbedekte teelt. Maximaal 5 toepassingen met 5 dagen interval. Geen VT.	
	Eradicoat Max 16056 (W.1)	20 ltr (max. 30 ltr)	-	maltodextrine	Groen middel, alle teelten! Maximaal 5 toepassingen met 3 dagen interval. Geen VT. Opletten met intensief toepassen!	
	Siltac SF (Protac)	0,6 ltr	-	siliconenpolymeren	Het middel heeft geen etiket. De 0,6 liter toepassen in 500 liter water	B

	Stix	1 – 1,5 ltr	-	siliconenpolymeren	Opletten met bladverbranding, altijd een proefbespuiting uitvoeren, bij voorkeur toepassen met maximaal 500 liter per hectare. De maximale dosering is 0,3%.	B
	Promanal HP 16278 N (W.-)	20 ltr (max. 30 ltr)	-	Paraffineoliën	Alle teelten, tegen fruitspintmijt. Toepassen vroege voorjaar, 1 toepassing per jaar toegelaten, op steenfruit de maximale dosering gebruiken. <i>Let op met drifteisen. Of met DRT 95, met 4,5 meter teeltvrij of DRT 97,5 bij kleiner dan 4,5 teeltvrij</i>	B
	Ovitex 16431 N (W.-)	20 ltr (max. 30 ltr)	-	Paraffineoliën	Alleen onbedekte teelt. Toepassen vroege voorjaar, 1 toepassing per jaar toegelaten. <i>Let op met drifteisen. DRT 99, met 4,5 meter teeltvrij</i>	B
Pruimenroest	Folicur SC 13057 N (W.6)	300 ml (max. 450 ml)	7	tebuconazool	Maximaal twee toepassingen met 21 dagen interval, bedekte en onbedekte teelten. 1 ^e toepassing BBCH 57-69, 2 ^e toepassing BBCH 71-85. Niet in grondwaterbeschermingsgebieden	B
	Folicur WG 11765 N (W.8)	0,5 kg (max. 0,75 kg)	7	tebuconazool	Maximaal twee toepassingen met 21 dagen interval, bedekte en onbedekte teelten. 1 ^e toepassing BBCH 57-69, 2 ^e toepassing BBCH 71-85. Niet in grondwaterbeschermingsgebieden	B
	Belanty 16459 N (W.-)	1,8 ltr	3	mefentrifluconazool	Max. 2 toepassingen met 7 dagen interval, alleen onbedekte teelt. Voor 1 mei 99 DRT, na 1 mei 95 DRT. Maximaal 1 toepassing in grondwaterbeschermingsgebieden	B
	Luna Experience 14777 N (W.2)	400 ml (max. 600 ml)	7	fluopyram + tebuconazool	Etiket: vruchtrot, werkt ook op tak- en bloesemsterfte. Maximaal 2 toepassingen met een interval van 14 dagen tussen twee bespuitingen. Niet toegelaten in de bedekte teelt	B
Hagelschotziekte	Kumulus S (6147 N W.8)	6 kg (max. 7,5 kg) Na de bloei, (Max. 6 kg)	7	zwavel	Alleen toegelaten voor de onbedekte teelt. Vóór 1 mei, alleen toepasbaar middels een DRT 99% techniek. Max. 2 toepassingen met 10 dagen interval. Na 31 mei van het betreffende jaar mag het middel niet meer toegepast worden!!	B
	Thiovit Jet (5395N W.8)	5 kg (max. 7,5 kg)	-	zwavel	Alleen toegelaten voor de onbedekte teelt. 1 toepassing voor de bloei toegelaten (7,5 kg/ha), maar wel 99% DRT. Ook 1 toepassing na de bloei toegelaten (6 kg/ha). Thiovit Jet mag toegepast worden tot en met juli van het betreffende jaar.	B
	Microthiol Special Liquid (16371 N W.1)	7,3 ltr	-	zwavel	Alleen toegelaten voor de onbedekte teelt. Toegelaten vanaf 1 mei tot eind juli. Max. 2 toepassingen met 7 dagen interval. Met DRT 95 en 450 cm teeltvrij of DRT 97,5 bij <dan 450 cm teeltvrij	
Tak- en bloesemsterfte en vruchtrot	Signum 12630 N (W.20)	0,5 kg (max. 0,75 kg)	7	pyraclostrobin + boscalid	Max. 3 bespuitingen per jaar, met 7 dagen interval. Met driftbeperkingen bruikbaar voor 1 mei. Niet toegelaten in de bedekte teelt	B
	Teldor 12130 N (W.7)	1 kg (max. 1,5 kg)	3	fenhexamid	Maximaal 3 toepassingen met 7 dagen interval. <i>Voor 1 mei beperkingen, maar wel bruikbaar.</i> Niet toegelaten in de bedekte teelt	B

	Captan Malvin 6782 (W.15)	1,5 kg (max. 2,25 kg)	21	captan	Maximaal 4 toepassingen met een interval van 10 dagen tussen de toepassingen. Niet toegelaten in de bedekte teelt	B
	Folicur SC 13057 N (W.6)	300 ml (max. 450 ml)	7	tebuconazool	Toegelaten voor bedekt en onbedekt. Maximaal twee toepassingen met 21 dagen interval. 1 ^e toepassing BBCH 57-69, 2 ^e toepassing BBCH 71-85. <i>Niet toegelaten in grondwaterbeschermingsgebied</i>	B
	Belanty 16459 N (W.-)	1,8 ltr	3	mefentrifluconazool	Max. 2 toepassingen met 7 dagen interval, alleen onbedekte teelt. Voor 1 mei 99 DRT, na 1 mei 95 DRT. Maximaal 1 toepassing in grondwaterbeschermingsgebieden	B
	Switch 12819 N (W.8)	0,8 kg (max. 1 kg)	7	cyprodinil + fludioxonil	Breedwerkend schimmel middel, met name sterk op Botrytis en Colletotrichem. Bij watergangen geen toelating voor 1 mei. Niet toegelaten in de bedekte teelt. Maximaal 3 toepassingen met 10 dagen interval	B
	Geoxe (Safir) 14414 N (W.4)	400 gr (max. 450 gr)	7	fludioxonil	Alleen onbedekte teelt. Maximaal 2 toepassingen met 10 dagen interval. Dit middel bevat de fludioxonil uit Switch, dus werkzaam op vruchtrot middels 1 werkzame stof.	
	Flint 12289 N (W.12)	100 gram (max. 150 gr)	7	trifloxystrobine	Maximaal 2 toepassingen, met 7 dagen interval Alleen onbedekte teelt, tevens nevenwerking op roest	B
	Serenade 14536 N (W.8)	5 – 8 ltr	-	Bacillus subtilis stam QST 713	Biologisch fungicide. Maximaal 6 toepassingen met een interval van 5 dagen. Bij voorkeur toepassen met een uitvloeier. Alleen onbedekte teelt.	
	Taegro 15794 N (W.2)	0,37 kg	4 uur	Bacillus amyloliquefaciens stam FZb 24	Biologisch fungicide. Maximaal 12 toepassingen met 3 dagen interval. Alle teelten	
	Amylo-X WG 16011 N (W.1)	2,5 kg	1	Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum D747	Biologisch fungicide. Maximaal 6 toepassingen met 7 dagen interval. Alle teelten	
	Serifel 15888 N (W.2)	0,5 kg	-	Bacillus amyloliquefaciens stam MBI 600	Groen middel. Maximaal 10 toepassingen met 7 dagen interval. Alleen onbedekte teelt. Geen VT.	
	Luna Experience 14777 N (W.2)	400 ml (max. 600 ml)	7	fluopyram + tebuconazool	Etiket: vruchtrot, werkt ook op tak- en bloesemsterfte. Maximaal 2 toepassingen met een interval van 14 dagen tussen twee bespuitingen. Niet toegelaten in de bedekte teelt	B
	Luna Privilege 13832 N (W.7)	150 ml	14	fluopyram	Etiket: meeldauw, maar werkt ook op tak- en bloesemsterfte. Maximaal 2 toepassingen met een interval van 14 dagen tussen twee bespuitingen. Niet toegelaten in de bedekte teelt	B
	Fado 14921 N (W.4)	2 ltr	3	COS-OGA	Groen middel, voor de onbedekte teelt, maximaal 8 toepassingen met 8 dagen interval en 3 dagen VT. <i>Bij voorkeur toepassen in menging of in een spuitschema</i>	
	Fado 14921 N (W.3)	3 – 4 ltr	-	COS-OGA	Groen middel, voor de bedekte teelt, maximaal 5 toepassingen met 7 dagen interval, geen VT.	

	Vacciplant 13383 N (W.3)	1 ltr	-	laminarin	Groen middel, voor de onbedekte teelt , maximaal 20 toepassingen met 10 dagen interval, geen VT.	
	Vacciplant 13383 N (W.3)	0,75 ltr	-	laminarin	Groen middel, voor de bedekte teelt , maximaal 7 toepassingen met 10 dagen interval, geen VT.	
	Karma 13854 N (W.7)	5 kg	1	kalium waterstofcarbonaat	Alleen toegelaten voor de onbedekte teelt, biologisch middel, voer altijd een proefbespuiting uit!! Maximaal 8 toepassingen met 7 dagen interval	
	Vintec 15689 N (W.3)	200 gr	-	Trichoderma atroviride strain SC1	Biologisch fungicide. Maximaal 2 toepassingen na de snoei met 7 dagen interval en maximaal 8 toepassingen tegen vruchtrot met 7 dagen interval. Alleen onbedekte teelt.	
	Problad 16572 N (W.-)	3,2 ltr	-	Extract van Lupinus albus	Groen middel, ter ondersteuning van andere middelen. Maximaal 3 toepassingen met 7 dagen interval. Alleen onbedekte teelt.	
Onkruid	Agil 100 EC 15291 N (W.2)	0,75 ltr (max. 1 ltr)	30	propaquizafob	Alleen werking op grassen. Maximaal 1 toepassing per seizoen, op kweekgras wel 2x met max. 0,75 ltr/ha. Niet toegelaten in tunnels en kassen	B
	AZ 500 15264 N (W.2)	0,3 ltr	-	isoxaben	Na oogst toepassing, toepassen in de herfst of winter , maximaal 1 toepassing per seizoen, niet toegelaten in grondwaterbeschermingsgebieden	B
	Quickdown 13246 N (W.5)	0,8 ltr	-	pyraflufen-ethyl	Alleen toegelaten binnen de onbedekte teelt. Maximaal 2 toepassingen per seizoen, met 21 dagen interval. Voeg bij de toepassing 1 liter Minerale- of onkruidolie per hectare toe.	B
**	Touchdown Quattro 12552 N (W.2)	1 ltr	-	glyfosaat (360 gr/ltr)	Bij voorkeur toepassen voor 1 juli. Maximaal 1 keer per seizoen!	B
	Rodeo Plus 16241 N (W.-)	1,5 ltr	28	glyfosaat (360 gr/ltr)	Bij voorkeur toepassen voor 1 juli. Maximaal 3 toepassingen met 28 dagen interval. Toepassen met DRT 90!	B
	RoundUp Dynamic 16394 N (W.-)	1 ltr	28	glyfosaat (500 gr/ltr)	Bij voorkeur toepassen voor 1 juli. Maximaal 2 toepassingen met 28 dagen interval	B
	Kerb Flo 13152 N (W.4)	2,5 ltr	-	propryzamide	Na-oogst toepassing, toepassen in de herfst of winter, maximaal 1 toepassing per seizoen, alleen onbedekte teelt	
	Devrinol 45 SC 14282 N (W.2)	2,7 ltr	-	napropamide	Bodemherbicide. Niet toegelaten in tunnels en kassen Maximaal 1 toepassing per seizoen, in het vroege voorjaar.	B
	Wing P (14881) N (W.1)	3 ltr	-	Dimethenamide-P + pendimethalin	Bodemherbicide. Niet toegelaten in tunnels en kassen Maximaal 1 toepassing per seizoen, waarschijnlijk in het vroege voorjaar.	B

- B* = beperkingen op etiket ten aanzien van gebruik langs bijvoorbeeld watergangen, moment van toepassing, etc. Lees voor gebruik het etiket.
- VT* = veiligheidsstermijn in dagen.

- Pas de dosering (met name bij insecticiden, maar ook bij fungiciden) aan op uw boomhoogte (boomgrootte). De gegeven doseringen zijn voor een standaard boomhoogte van 2.25 meter. Veel kersen en pruimenaanplanten zijn vele malen hoger of groter. Bij een boomhoogte van 2.75 meter is het toegestaan de dosering te verhogen met 20% en bij bomen van 3.25 meter of groter is het toegestaan de dosering te verhogen met 40%. Houdt hier bij de inzet van de middelen rekening mee.
- Let bij de middel Pirimor op met de zogenaamde "Re- entry". Voor dit middel geldt dat na een toepassing tot 14 dagen lang uitsluitend in het gewas mag worden gewerkt met beschermende kleding. Dit geldt ook als er binnen 14 dagen na de toepassing geoogst en gesorteerd wordt. Voor alle andere middelen geldt pas weer in het gewas aan het werk, nadat het gewas is opgedroogd. Bij gebruik in kassen geldt, eigenlijk voor alle middelen, eerst twee uur ventileren en vervolgens mag de ruimte weer betreden worden. (Zie voor etiketten: www.fytostat.nl of www.ctgb.nl, of overleg met uw voorlichter)
- Binnen een geïntegreerde teelt zoveel mogelijk selectieve middelen inzetten, met geen of weinig effect op natuurlijke vijanden.
- In beschermde teelten is het uitzetten van natuurlijke vijanden een goede optie. Voor meer informatie omtrent eventuele biologische bestrijding neem contact op met uw voorlichter.
- ** Dit zijn twee middelen op basis van glyfosaat met specifiek steenvrucht op het etiket. Enkele andere middelen op basis van glyfosaat hebben grootfruit op hun etiket staan. Middels de DTG lijst van juni 2015, versie 2.1 mogen deze middelen dus ook onder pruimen. Enkele middelen die dan onder steenfruit (o.a. pruim en kers) toegepast mogen worden zijn: Clinic Free en Roundup Dynamic.