

CropSeeds Groenbemesters

2026

*“Groenbemesterteelt is
de voorbereiding voor
volgend seizoen.”*



AgruniekRijnvallei



groei door kennis

Keuzeschema groenbemesters

Om een groenbemester te kiezen die goed bij het bedrijf en het perceel past, is het belangrijk het teeltdoel van de groenbemester en de gewenste effecten in kaart te brengen. Hieronder vindt u ons keuzeschema om een overwogen keuze te maken.

Groenbemesterkeuze			
Enkelvoudig → eenvoudig telen; goed resultaat			
Beworteling	Diepte wortel voor structuur	→	Bladrammanas 
	Vorstgevoelig voor eenvoudige vernietiging	→	Gele mosterd
	Maximale biomassa, klepelen voor vernietiging	→	Wintergranen 
Voederwinning	Snede gras	→	Italiaans raaigras 
	Snelle groei, veel organische stof	→	Japanse haver 
	Beste voederwaarde	→	Snelle lente rogge 
Aaltjesbeheersing	Bestrijding wortellesieaaltje	→	Tagetus
Meervoudig → meer soorten; meer kracht			
Optimale biodiversiteit	Vorstgevoelig, NKG-geschikt en bloemrijk	→	NKG Najaar
	Organische stof, effect op bodemstructuur	→	N-Fixx 50
	Maximale organische stof en geschikt als vanggewas na mais	→	Humus N-fixx 
Voederwinning	Snede gras-klover in 1 zak	→	Vanggras 
	Optimale graskwaliteit	→	Powerhybride + inkarnaatklover 
Aaltjesbeheersing	Bestrijding aaltjes voor zaai fijnzadige gewassen	→	Betamaxx



Deze groenbemesters tellen mee als vanggewas na de mais.



groei door kennis

www.cropsolutions.eu

Assortiment eenvoudige groenbemesters

Hieronder zijn verschillende groenbemesters overzichtelijk weergegeven met de belangrijkste gegevens. Er worden alleen eenvoudige groenbemesters weergegeven, echter is van ieder soort groenbemester ook een variant beschikbaar die voldoet aan de eisen voor GLB.

Bladrammenas

- BCA 1 vroeg- en laatbloeiend
- BCA 1 multiresistente rassen

• 25 kg/ha | half juni - begin september



Gele mosterd

- BCA 1 en BCA 2 rassen

• 20 kg/ha | half augustus - eind september



Japanse haver

- Diverse rassen (snelle groei, veel organische stof)

• 70 kg/ha | half augustus - eind september



Italiaans raai gras

- Diverse rassen (late zaai, wintervast)

• 25 kg/ha | eind augustus - oktober



Wintergranen

- Wintergerst of winterrogge (late zaai, biomassa)

• 80 kg/ha | augustus - oktober



Facelia

(bijenbrood, aantrekkelijk voor diverse insecten)

• 10 kg/ha | juni - begin september



Vlinderbloemigen

- **Witte klaver** (geschikt voor inzaai onder dekrucht, oppervlakkige beworteling, minder geschikt voor NKG)
- **Rode klaver** (geschikt voor inzaai onder dekrucht, grove penwortel, minder geschikt voor NKG)
- **Inkarnaatklaver** (eenjarig, hoge org. stof productie, groeit goed onder oude en natte omstandigheden)
- **Alexandrijnse klaver** (eenjarig, geschikt voor inzaai onder dekrucht, slaat makkelijk aan)
- **Perzische klaver** (eenjarig, kan later in het jaar gezaaid worden)
- **Wikke** (stikstofbinding)

- 7 kg/ha | juni - half augustus
- 14 kg/ha | juni - half augustus
- 20 kg/ha | juni - eind september
- 25 kg/ha | juni - half augustus
- 25 kg/ha | juni - half augustus
- 100 kg/ha | juni - half augustus



Tagetes Patula

(bestrijding wortelstokjes)

• 20 kg/ha | juni - eind augustus



Zonnebloemen

(aantrekkelijk gewas, steunt groei van andere componenten in mengsel)

• 15 - 25 kg/ha | juli - augustus



Doelen groenbemester:

Voor de juiste keuze van een groenbemester is het belangrijk om het doel van een groenbemester duidelijk te hebben. Doelen waar je aan kunt denken zijn:



Organische stof
Structuur
Aaltjesbestrijding
Stikstofbinding



Biodiversiteit
NKG
Voederwinning
Telt als vanggewas na mais

Assortiment meervoudige groenbemesters



NKG Najaar



Samenstelling: Olivielas (50%), Gele mosterd (35%), Facelia (15%)

Zaaitijdstip: Augustus - oktober

Zaaihoeveelheid: 20 kg/ha



TerraLife® N-Fixx 50



Samenstelling: Alexandrijnse klaver (3%), Erwt (15%), Vlas (6%), Facelia (4%), Niger (4%), Zonnebloem (12%), Zomerwikke (22%), Squarrosom klaver (9%), Sorghum (5%), Veldboon (20%)

Zaaitijdstip: Eind juli - eind augustus

Zaaihoeveelheid: 40 - 45 kg/ha



Humus N-fixx



Samenstelling: Japanse haver (67%), Zomerwikke (18%), Inkarnaatklaver (10%), Facelia (5%)

Zaaitijdstip: Juni - oktober

Zaaihoeveelheid: 40 kg/ha



TerraLife® BetaMaxx TR



Samenstelling: Alexandrijnse klaver (2,5%), Facelia (6%), Niger (10%), Japanse haver (28%), Ethiopische mosterd (3%), Zomerwikke (15%), Serradella (3,5%), Vlas (6%), Deep tillage rammenas (8%), Erwt (18%)

Zaaitijdstip: Eind juli - 20 augustus

Zaaihoeveelheid: 30 - 40 kg/ha



Vanggras



Samenstelling: Italiaans raaigras (55%), Gekruist raaigras (15%), Inkarnaatklaver (20%), Voederwikke (10%)

Zaaitijdstip: Mei - oktober

Zaaihoeveelheid: 40 kg/ha



Extra Powerhybride



Samenstelling: Italiaans raaigras (50%), Raaigras Plus (30%), Engels raaigras (20%)

Zaaitijdstip: April - oktober

Zaaihoeveelheid: 40 kg/ha

Doelen groenbemester:

Voor de juiste keuze van een groenbemester is het belangrijk om het doel van een groenbemester duidelijk te hebben. Doelen waar je aan kunt denken zijn:



Organische stof



Structuur



Aaltjesbestrijding



Stikstofbinding



Biodiversiteit



NKG



Voederwinning



Telt als vanggewas na mais



Wilt u meer informatie over ziekten, plagen en aaltjes toegepast op uw bouwplan en grondsoort, kijk dan eens op de website van Best4soil. Hier kunt u een zeer uitgebreid aaltjesschema en schimmelschema maken aangepast op uw perceel.

Organische stof en inzaaimoment

Is organische stof opbouwen een belangrijk doel van uw groenbemester, houd er dan rekening mee dat er veel verschil zit tussen de groenbemesters en het zaaitijdstip. Bekijk per zaaitijdstip waar u de hoogste organische stof mee kunt behalen.

Groenbemester	Zaaitijdstip						
	15 juli	1 aug.	15 aug.	1 sep.	15 sep.	1 okt.	15 okt.
Winterrogge	800					650	400
Japanse haver	-	1650	1000	500	400	350	300
Wikke	800	700	500	350	250	-	-
Bladrammanas	2050	1600	950	650	350	150	-
Italiaans raaigras	1850	1600	1250	1000	750	450	200
Facelia	-	1100	600	350	150	50	-
Rietzwenkgras	-	-	-	-	1050		-
Gele mosterd	1800	1250	750	500	350	250	-
Tagetes	2500	1350	1200	-	-	-	-

Aanvoer van effectieve organische stof (EOS) in kg per ha van een aantal groenbemesters afhankelijk van het zaaitijdstip dan wel oogstmoment van het hoofdgewas in geval van onderteelt.

“Verhoogt niet alleen de biodiversiteit en organische stofgehalte, maar zorgt ook voor een goede bodem- en plantgezondheid.”



Nawerking gewasbeschermingsmiddelen

Houd rekening met de incidentele nawerking van gewasbeschermingsmiddelen, die in de teelt voor de te zaaien groenbemester zijn ingezet. Droogte en aanwendingstijdstip kunnen afbraak van meer persistente middelen vertragen. Dit kan een negatief effect hebben op de groei van sommige groenbemestersoorten. Advies: verwacht u nawerking van herbiciden en wilt u geen risico's nemen? Zaai dan een gras(mengsel), maar zeker geen cruciferen (zoals mosterd of bladrammenas).

Regelgeving groenbemesters

Zowel veehouders als akkerbouwers hebben te maken met de verplichting tot inzaai van een groenbemester. De regels die te maken hebben met de zaai hiervan staan hieronder beschreven

Algemeen:

- Als u mest wilt uitrijden na de graanteelt geldt de verplichting tot het inzaaien van een vanggewas. Deze groenbemester moet uiterlijk 15 september gezaaid zijn, en moet minimaal 8 weken blijven staan. Met de zaai van koolzaad voldoet u ook aan deze regel, mits de koolzaad voor zaadwinning geteeld wordt.

Kleigrond:

- Op kleigrond geldt de verplichting dat 80% van het bouwland voor 80% bedekt moet zijn tussen 1 augustus en 30 november. Gewassen, groenbemesters en ook stoppels vallen onder deze bedekking. Het kan zijn dat u een groenbemester moet zaaien na oogst van vroeg te oogsten gewassen om aan deze verplichting te voldoen.

Zand- en lössgronden:

- Op zand- en lössgrond is het verplicht op na de maisteelt verplicht een vanggewas te telen. Dit vanggewas moet in ieder geval tussen 1 oktober en 1 februari op het perceel staan. Op de site van de RVO zijn de gewassen aangegeven die officieel meetellen als vanggewas na mais, dit zijn voornamelijk grassen, wintergranen en bladrammenas.
- Op zand- en lössgrond met andere akkerbouwgewassen dan mais moet ook op 1 oktober een vanggewas ingezaaid zijn, tenzij er een winterteelt staat. Als er op 1 oktober niet gezaaid is, geldt er een korting op de stikstofnorm in het volgende jaar.



Meer weten?
Scan de QR code



AgruniekRijnvallei

T 0418 65 59 44
www.argroep.nl