

## Toelatingen in de teelt van kers

De onderstaande gegevens zijn zorgvuldig samengesteld (januari 2023). De opsteller is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onvolledigheden. Raadpleeg voor gebruik altijd de meest recente etikettekst ([www.ctgb.nl](http://www.ctgb.nl)) of uw voorlichter. Let op beperkingen in gebruik van middelen (o.a. langs watergangen, aantal bespuitingen, etc.)

TOELATINGEN IN DE TEELT VAN KERS 2023						
Plaag / ziekte	Middel	Dosering per hectare	VT* (dg)	Actieve stof	Opmerkingen	B*
Bladluizen	Pirimor 5794 N (W.12)	0,5 kg	7	pirimicarb	<b>Niet toegelaten in de bedekte teelt.</b> Maximaal 2 toepassingen met 7 dagen interval. Te gebruiken in de bloei. Door driftbeperkingen bij watergangen nauwelijks bruikbaar. (alleen toegelaten na 1 mei en dan 99% DRT)	B
	Movento 13404 N (W.7)	0,5 ltr (max. 0,75 ltr)	21	spirotriamat	<i>Niet toepassen op bloeiende gewassen. Niet toegelaten in de bedekte teelt.</i> Nevenwerking tegen larven van de kersenvlieg. Max. 2 toepassingen met 14 dagen interval. <i>Let op met zware drifteisen, alleen toegelaten na 1 mei en dan 95% DRT, met 4,5 meter teeltvrij of DRT 97,5 bij kleiner dan 4,5 teeltvrij</i>	B
	Batavia 15615 (W.6)	0,75 ltr (max. 1,1 ltr)	21	spirotriamat	<i>Niet toepassen op bloeiende gewassen. Niet toegelaten in de bedekte teelt.</i> Nevenwerking tegen larven van de kersenvlieg. Max. 2 toepassingen met 14 dagen interval	B
	Teppeki 12757 (W.12)	140 gram	14	flonicamid	<i>Niet toepassen op bloeiende gewassen, dan alleen na zonsondergang toepassen. Niet toegelaten in de bedekte teelt.</i> Max. 2 toepassingen per seizoen, met 21 dagen interval	B
	Afinto 16104 (W.3)	140 gram	14	flonicamid	Zie Tepeki, zelfde werkzame stof, alleen andere fabrikant	B
	NeemAzal-T/S 12455 (W.6)	2 – 3 liter (max. 3 – 4,5 ltr)	-	azadirachtin	<i>Niet toepassen op bloeiende gewassen. Alleen toegelaten voor de onbedekte teelt.</i> Toepassen met DRT 99 en 450 cm teeltvrij. <b>Voor 1 mei</b> max. 3 ltr/ha, <b>na 1 mei</b> max. 4,5 ltr/ha toepassen. Max. 3 toepassingen per seizoen, met 7 dagen interval <i>In grondwaterbeschermingsgebieden verboden tussen 1-9 en 1-3</i>	B
Groene appelwants	Promanal HP 16278 N (W.-)	20 ltr (max. 30 ltr)	-	Paraffineoliën	<b>Alle teelten.</b> Toepassen vroege voorjaar, 1 toepassing per jaar toegelaten, op steenfruit de maximale dosering gebruiken. <i>Let op met drifteisen. Of met DRT 95, met 4,5 meter teeltvrij of DRT 97,5 bij kleiner dan 4,5 teeltvrij.</i>	B
	Ovitex 16431 N (W.-)	20 ltr (max. 30 ltr)	-	Paraffineoliën	<b>Alleen onbedekte teelt.</b> Toepassen vroege voorjaar, 1 toepassing per jaar toegelaten, op steenfruit de maximale dosering gebruiken. <i>Let op met drifteisen. DRT 99, met 4,5 meter teeltvrij</i>	B

Kersenvlieg	Gazelle 12809 N (W.6)	250 gram (max. 375 gr)	14	acetamiprid	Op etiket alleen kersenvlieg. <b>Niet toegelaten in de bedekte teelt.</b> Werkt ook op <b>wantsen, bladluizen en kevers</b> . Max. 2x per seizoen, met 30 dagen interval tussen toepassingen. <i>Voor 1 mei, maximaal 206 gram middel per hectare, toepassen met DRT 95. Max. 1 toepassing voor 1 mei</i>	B
	Movento	0,5 ltr (max. 0,75 ltr)	21	spirotriamat	<i>Niet toepassen op bloeiende gewassen. <b>Niet toegelaten in de bedekte teelt.</b></i>	B
	Batavia	0,75 ltr (max. 1,1 ltr)	21	spirotriamat	<i>Niet toepassen op bloeiende gewassen. <b>Niet toegelaten in de bedekte teelt.</b></i>	
Rupsen en motten	XenTari WG 12437 N (W.4)	1 kg (max 1,5 kg)	-	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai	<b>Alleen onbedekte teelt</b> , 10 toepassingen met 6 dagen interval, geen VT	B
	Dipel DF 14674 N (W.1)	1,5 kg	-	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Op het etiket: steenfruit breed toegelaten Maximaal 8 toepassingen met 7 dagen interval, geen VT	
	Costar WG 15885 N (W.1)	0,3 – 1 kg	-	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Op het etiket: steenfruit breed toegelaten Maximaal 6 toepassingen met 7 dagen interval, geen VT	
	NeemAzal-T/S 12455 (W.6)	2 – 3 liter (max. 3 – 4,5 ltr)	-	azadirachtin	<i>Niet toepassen op bloeiende gewassen. <b>Alleen toegelaten voor de onbedekte teelt.</b></i> Toepassen met DRT 99 en 450 cm teeltvrij. <b>Voor 1 mei</b> max. 3 ltr/ha, <b>na 1 mei</b> max. 4,5 ltr/ha toepassen. Max. 3 toepassingen per seizoen, met 7 dagen interval <i>In grondwaterbeschermingsgebieden verboden tussen 1-9 en 1-3</i>	B
Spint – en roestmijten	Cantack 12939 N (W.5)	0,9 ltr	21	acequinocyl	Maximaal 1 toepassing per seizoen, <b>alleen toegelaten voor de onbedekte teelt</b> , toepassen met minimaal 90% DRT!	B
	Scelta 13440 (W.7)	1 ltr	-	cyflumetofen	Toegelaten <b>na de oogst</b> , zowel voor de bedekte en onbedekte teelt, maximaal 2 toepassingen met 7 dagen interval	B
	Vertimec Gold 13087 N (W.9)	0,75 ltr (max. 1,1 ltr)	28	abamectine	<b>Alleen nog toegelaten voor de bedekte teelt!</b> Maximaal <u>twee</u> keer, per teeltcyclus toepassen. Het minimale interval is 10 dagen.	B
	Vertimec Pro 15315 N (W.1)	0,5 ltr	28	abamectine	<b>Alleen toegelaten voor de <u>onbedekte teelt!</u></b> Maximaal 1 toepassing	B
	Botanigard WP 12612 (W.4)	0,625 kg	1	Beauveria bassiana	Max. 25 toepassingen met een minimaal interval van 5 dagen. Alleen toegelaten voor de onbedekte teelt, werkt ook op trips	
	Botanigard Vlb. 12612 (W.4)	1,25 ltr	1	Beauveria bassiana	Max. 25 toepassingen met een minimaal interval van 5 dagen. Alleen toegelaten voor de onbedekte teelt, werkt ook op trips	
	Flipper (RUB)	10 ltr	–	kaliumvetzuren	Biologisch middel, ter bestrijding van bladluizen, <b>spint, roestmijt</b> , trips en witte vlieg.	
	Neudosan 16452 (W.-)	14 ltr	-	vetzuren en kaliumzouten	Groen middel, <b>alleen toegelaten voor de onbedekte teelt.</b> Maximaal 5 toepassingen met 5 dagen interval. Geen VT.	
	Eradicoat Max 16056 (W.1)	20 ltr (max. 30 ltr)	-	maltodextrine	Groen middel, <b>alle teelten!</b> Maximaal 5 toepassingen met 3 dagen interval. Geen VT. Opletten met intensief toepassen!	B

	Siltac SF (Protac)	0,6 ltr	-	siliconenpolymeren	Het middel heeft geen etiket. De 0,6 liter toepassen in 500 liter water	B
	Stix	1 – 1,5 ltr	-	siliconenpolymeren	Opletten met bladverbranding, altijd een proefbespuiting uitvoeren, bij voorkeur toepassen met maximaal 500 liter per hectare. De maximale dosering is 0,3%.	B
	Promanal HP 16278 N (W.-)	20 ltr (max. 30 ltr)	-	Paraffineoliën	<b>Alle teelten.</b> Toepassen vroege voorjaar, 1 toepassing per jaar toegelaten, op steenfruit de maximale dosering gebruiken. <i>Let op met drifteisen. Of met DRT 95, met 4,5 meter teeltvrij of DRT 97,5 bij kleiner dan 4,5 teeltvrij.</i>	B
	Ovitex 16431 N (W.-)	20 ltr (max. 30 ltr)	-	paraffineoliën	<b>Alleen onbedekte teelt.</b> Toepassen vroege voorjaar, 1 toepassing per jaar toegelaten, op steenfruit de maximale dosering gebruiken. <i>Let op met drifteisen. DRT 99, met 4,5 meter teeltvrij</i>	B
Bladvalziekten	Syllit Flow 400 SC 11647 N (W.4)	1,7 ltr	14	dodine	Alleen onbedekte teelt, maximaal 2 toepassingen met 60 dagen interval. Toepassen na de bloei tot oogst of naoogst	B
	Syllit 544 SC 16287 N (W.-)	1,25 ltr	14	dodine	Alleen onbedekte teelt, maximaal 2 toepassingen met 60 dagen interval. Toepassen na de bloei tot oogst of naoogst	B
	Dodifun SC 16268 N (W.-)	1,7 ltr	14	dodine	Alleen onbedekte teelt, maximaal 1 toepassing. Toepassen na de bloei tot oogst of naoogst	
	Delan DF 10001 N (W.14)	0,75 kg	21	dithianon	Bedekt en onbedekt, max. 4 toepassingen, 3x voor de oogst en 1x na de oogst. Met 7 dagen interval tussen bespuitingen	B
	Signum 12630 N (W.20)	0,75 kg	7	pyraclostrobin + boscalid	Max. 3 bespuitingen per jaar, met 7 dagen interval. <b>Etiket: tak-en bloesemsterfte en vruchtrot. Niet toegelaten in de bedekte teelt,</b> toepassen met 95% DRT	B
	Flint 12289 N (W.12)	100 gram (max. 150 gr)	14	trifloxystrobine	<b>Etiket: schurft,</b> maar ook effectief tegen bladvalziekte en tak en bloesemsterfte. <b>Alleen onbedekte teelt.</b> Max. 3x met 7 dagen interval. Let op gewasveiligheid. Max 100 g/ha.	B
Schurft	Flint	100 gram	14	trifloxystrobine	<b>Etiket: schurft,</b> maar ook effectief tegen bladvalziekte en tak en bloesemsterfte. <b>Alleen onbedekte teelt.</b> Max. 3x met 7 dagen interval. Let op gewasveiligheid. Max 100 g/ha.	B
Hagelschotziekte	Kumulus S (6147 N W.8)	6 kg (max. 7,5 kg)	7	zwavel	<b>Alleen toegelaten voor de onbedekte teelt.</b> Vóór 1 mei, alleen toepasbaar met 99% DRT. Maximaal 2 toepassingen met 10 dagen interval. Na 31 mei van het betreffende jaar mag het middel niet meer toegepast worden!!	B
	Thiovit jet (5395 N W.8)	5 kg (max. 7,5 kg)	-	zwavel	<b>Alleen toegelaten voor de onbedekte teelt, uitsluitend na de bloei.</b> Vóór 1 mei, alleen toepasbaar met 99% DRT. Max. 2 toepassingen met 14 dagen interval. Na juli van het betreffende jaar mag het middel niet meer toegepast worden!!	B

Tak- en bloesemsterfte en vruchtrot	Signum	0,75 kg	7	pyraclostrobin + boscalid	Max. 3 bespuitingen per jaar, met 7 dagen interval. <b>Niet toegelaten in de bedekte teelt</b> , toepassen met 95% DRT	B
	Luna Experience 14777 N (W.2)	400 ml (max. 600 ml)	7	fluopyram + tebuconazool	Maximaal 2 toepassingen met een interval van 14 dagen tussen twee bespuitingen. <b>Niet toegelaten in de bedekte teelt</b>	B
	Luna Privilege 13832 N (W.7)	150 ml	14	fluopyram	Maximaal 2 toepassingen met een interval van 14 dagen tussen twee bespuitingen. <b>Niet toegelaten in de bedekte teelt</b>	B
	Captan <b>Malvin</b> 6782 (W.15)	1,5 kg (max. 2,25 kg)	21	captan	Maximaal 3 toepassingen met een interval van 7 dagen tussen twee toepassingen. <b>Niet toegelaten in de bedekte teelt</b>	B
	Teldor 12130 N (W.7)	1 kg (max. 1,5 kg)	3	fenhexamid	Maximaal 3 toepassingen met 7 dagen interval. <i>Voor 1 mei beperkingen, maar wel bruikbaar.</i> <b>Niet toegelaten in de bedekte teelt</b>	B
	Folicur SC 13057 N (W.6)	300 ml (max. 450 ml)	7	tebuconazool	Max. 2 toepassingen met 21 dagen interval, <b>bedekte en onbedekte teelten</b> . 1 <sup>e</sup> x BBCH 57-69, 2 <sup>e</sup> x BBCH 71-85. <b>Niet toegelaten in grondwaterbeschermingsgebieden</b>	B
	Folicur WG 11765 N (W.8)	0,5 kg (max. 0,75 kg)	7	tebuconazool	Maximaal twee toepassingen met 21 dagen interval, <b>bedekte en onbedekte teelten</b> . 1 <sup>e</sup> x BBCH 57-69, 2 <sup>e</sup> x BBCH 71-85. <b>Niet toegelaten in grondwaterbeschermingsgebieden</b>	B
	Belanty 16459 N (W.-)	1,8 ltr	3	mefentrifluconazool	Max. 2 toepassingen met 7 dagen interval, <b>alleen onbedekte teelt</b> . Voor 1 mei 99 DRT, na 1 mei 95 DRT. <b>Maximaal 1 toepassing in grondwaterbeschermingsgebieden</b>	B
	Switch 12819 N (W.8)	0,8 kg (max. 1 kg)	7	cyprodinil + fludioxonil	Breedwerkend middel, met name sterk op Botrytis en Colletotrichum. <b>Niet toegelaten in de bedekte teelt.</b> <i>Bij watergangen geen toelating voor 1 mei.</i> Maximaal 3 toepassingen met een interval van 10 dagen.	B
	Geoxe (Safir) 14414 N (W.4)	400 gr (max. 450 gr)	7	fludioxonil	<b>Alleen onbedekte teelt</b> . Maximaal 2 toepassingen met 10 dagen interval. Dit middel bevat de fludioxonil uit Switch, dus werkzaam op vruchtrot middels 1 werkzame stof.	
	Flint	100 gram	14	trifloxystrobine	<b>Alleen onbedekte teelt</b> . Max. 3 toepassingen met 7 dagen interval. Let op gewasveiligheid. Max 100 g/ha	B
	Serenade 14536 N (W.8)	5 – 8 ltr	-	Bacillus amyloliquefaciens QST 713	Groen middel. Maximaal 6 toepassingen met 5 dagen interval. <b>Alleen onbedekte teelt</b>	
	Sonata 14536 N (W.2)	10 ltr	1	Bacillus pumilus QST 2808	Groen middel. Maximaal 6 toepassingen met 5 dagen interval. <b>Alle teelten</b>	
	Taegro 15794 N (W.2)	0,37 kg	4 uur	Bacillus amyloliquefaciens stam FZb 24	Groen middel. Maximaal 12 toepassingen met 3 dagen interval. <b>Alle teelten</b>	
	Amylo-X WG 16011 N (W.1)	2,5 kg	1	Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum D747	Groen middel. Maximaal 6 toepassingen met 7 dagen interval. <b>Alle teelten</b>	

	Fado 14921 N (W.3)	3 – 4 ltr	-	COS-OGA	Groen middel, preventief tegen meeldauw en een nevenwerking tegen vruchtrot! Maximaal 5 toepassingen met 7 dagen interval. <b>Alleen toegelaten voor de bedekte teelt</b>	
	Vacciplant 13383 N (W.3)	1 ltr	-	laminarin	Groen middel, voor de <b>onbedekte teelt</b> , maximaal 20 toepassingen met 10 dagen interval, geen VT.	
	Vacciplant 13383 N (W.3)	0,75 ltr	-	laminarin	Groen middel, voor de <b>bedekte teelt</b> , maximaal 7 toepassingen met 10 dagen interval, geen VT.	
	Karma 13854 N (W.7)	5 kg	1	kalium waterstofcarbonaat	Groen middel, <b>maar voer altijd een proefbespuiting uit!!</b> Maximaal 8 toepassingen met 7 dagen interval	
	Vintec 15689 N (W.3)	200 gr	1	Trichoderma atroviride strain SC1	Groen middel. Maximaal 4 toepassingen met 7 dagen interval. <b>Alleen onbedekte teelt.</b>	
Groei regulatie	Kudos 15307 N (W.1)	1,25 kg	20	Prohexadion- calcium	Max. 2 bespuitingen per jaar, met 14 dagen interval. <b>Zowel de bedekte als onbedekt teelt toegelaten.</b>	B
	Valioso ST 14917 N (W.1)	20 tabletten	-	gibberellinezuur	Max. 1 toepassing per seizoen, <b>alleen de onbedekte teelt</b> . Inzet geeft: verhoging van de vruchthardheid, bevordering van de vruchtgrootte en ca. 5 dagen oogstvertraging	
Onkruid	Agil 100 EC 15291 N (W.2)	0,75 ltr (max. 1 ltr)	30	propaquizafob	Alleen werking op grassen. Maximaal 1 toepassing per seizoen, op kweekgras wel 2x met max. 0,75 ltr/ha. <b>Niet toegelaten in tunnels en kassen</b>	B
	AZ 500 15264 N (W.2)	0,3 ltr	-	isoxaben	Na oogst toepassing, toepassen in de herfst of <b>winter</b> , maximaal 1 toepassing per seizoen, <b>niet toegelaten in grondwaterbeschermingsgebieden</b>	B
	Quickdown 13246 N (W.5)	0,8 ltr	-	pyraflufen-ethyl	Alleen toegelaten binnen de onbedekte teelt. Maximaal 2 toepassingen per seizoen, met 21 dagen interval. Voeg bij de toepassing 1 liter Minerale- of onkruidolie per hectare toe.	B
**	Touchdown Quattro 12552 N (W.2)	1 ltr	-	glyfosaat (360 gr/ltr)	Bij voorkeur toepassen voor 1 juli. Maximaal 1 keer per seizoen!	B
	Rodeo Plus 16241 N (W.-)	1,5 ltr	28	glyfosaat (360 gr/ltr)	Bij voorkeur toepassen voor 1 juli. Maximaal 3 toepassingen met 28 dagen interval. Toepassen met DRT 90!	B
	RoundUp Dynamic 16394 N (W.-)	1 ltr	28	glyfosaat (500 gr/ltr)	Bij voorkeur toepassen voor 1 juli. Maximaal 2 toepassingen met 28 dagen interval	B
	Kerb Flo 13152 N (W.4)	2,5 ltr	-	propyzamide	Na-oogst toepassing, toepassen in de herfst of <b>winter</b> , maximaal 1 toepassing per seizoen, alleen onbedekte teelt	B
	Devrinol 45 SC 14282 N (W.2)	2,7 ltr	-	napropamide	Bodemherbicide. <b>Niet toegelaten in tunnels en kassen</b> Maximaal 1 toepassing per seizoen, in het vroege voorjaar	B
	Wing P 14881 N (W.1)	3 ltr	-	Dimethenamide-P + pendimethalin	Bodemherbicide. <b>Niet toegelaten in tunnels en kassen</b> Maximaal 1 toepassing per seizoen, in het vroege voorjaar.	B

- B\* = beperkingen op etiket ten aanzien van gebruik langs bijvoorbeeld watergangen, moment van toepassing, maximale dosering, etc.  
Lees voor gebruik het etiket!
- VT\* = veiligheidstermijn in dagen.
- Pas de dosering (met name bij insecticiden, maar ook bij fungiciden) aan op uw boomhoogte (boomgrootte). De gegeven doseringen zijn voor een standaard boomhoogte van 2.25 meter. Veel kersen en pruimenaanplanten zijn vele malen hoger of groter. Bij een boomhoogte van 2.75 meter is het toegestaan de dosering te verhogen met 20% en bij bomen van 3.25 meter of groter is het toegestaan de dosering te verhogen met 40%. Houdt hier bij de inzet van de middelen rekening mee.
- Let bij het middel Pirimor op met het zogenaamde "Re- entry". Voor alle andere middelen geldt pas weer in het gewas aan het werk, nadat het gewas is opgedroogd. Bij gebruik in kassen geldt, voor bijna alle middelen, eerst twee uur ventileren en vervolgens mag de ruimte weer betreden worden. (Zie voor etiketten: [www.fytostat.nl](http://www.fytostat.nl) of [www.ctgb.nl](http://www.ctgb.nl), of overleg met uw voorlichter)
- Binnen een geïntegreerde teelt zoveel mogelijk selectieve middelen inzetten, met geen of weinig effect op natuurlijke vijanden.
- In beschermde teelten is het uitzetten van natuurlijke vijanden een goede optie. Voor meer informatie omtrent eventuele biologische bestrijding neem contact op met uw voorlichter.
- **\*\* Dit is een middel op basis van glyfosaat met specifiek kers (steenvrucht) op het etiket. Enkele andere middelen op basis van glyfosaat hebben grootfruit op hun etiket staan. Middels de DTG lijst van juni 2015, versie 2.1 mogen deze middelen dus ook onder kersen. Enkele middelen die dan onder kersen toegepast mogen worden zijn: Clinic Free en Roundup Dynamic.**