

Toelatingen in de teelt van aalbessen (rode, witte en zwarte bessen)

De onderstaande gegevens zijn zorgvuldig samengesteld (januari 2026). De opsteller is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onvolledigheden.
Raadpleeg voor gebruik altijd de meest recente etikettekst (www.ctgb.nl) of uw voorlichter.
Let op beperkingen in gebruik van middelen (o.a. langs watergangen, aantal bespuitingen, etc.)

TOELATINGEN IN DE TEELT VAN AALBESSEN 2026

Plaag/ziekte	Middelen	Dosering/ ha	V.T.	Werkzame stof	Opmerkingen
Blad- en dopluizen	Pirimor 5794 (W.12)	500 gram	3	pirimicarb	Niet toegelaten binnen de bedekte teelt en niet op percelen welke aan watergangen grenzen , werkt ook op jonge larven bessenbladwespe. Max. 2 toepassingen met een interval van 12 dagen. Uitverkoop 15 september 2026 en opgebruik 31 december 2026
	Teppeki 12757 N (W.15)	140 gram	10	flonicamid	Alleen toegelaten onbedekte teelt , maximaal 2 toepassingen met 7 dagen interval. Niet in de bloei! In de bloei alleen toepassen tussen zonsondergang en zonsopkomst.
	Afinto 16104 N (W.5)	140 gram	10	flonicamid	Alleen toegelaten onbedekte teelt , maximaal 2 toepassingen met 7 dagen interval. Niet in de bloei! In de bloei alleen toepassen tussen zonsondergang en zonsopkomst.
	Sivanto Prime 15598N (W.5)	300 ml	3	flupyradifuron	Alleen toegelaten onbedekte teelt , maximaal 1 toepassing. Niet in de bloei toepassen! Niet toegelaten in grondwaterbeschermingsgebieden. Toepassen met DRT 90 en 300 cm teeltvrij of DRT 75 met 450 cm teeltvrij
	ER II 15175 (W.-)	25 ltr (max. 30 ltr)	—	maltodextrine	Liefst niet kort voor de oogst toepassen. Werkt ook goed op witte vlieg en cicaden Eradicoat Max is vergelijkbaar met ER II. Opgebruik 30 december 2026
	Eradicoat Max 16056 (W.1)	20 ltr (max. 24 ltr)	—	maltodextrine	Bedekte teelt: 40 toepassingen met 3 dagen interval Onbedekte teelt: 5 toepassingen met 3 dagen interval
	Mycotal 10980 (W.4)	1 kg (max. 2 kg)	1	Lecanicillium muscarium stam Ve6	Groen insecticide, alleen toegelaten voor de bedekte teelt . Werkt met name goed op kleinere plaaginsecten, zoals naast bladluizen ook witte vlieg. Maximaal 12 toepassingen met 7 dagen interval
	NeemAzal-TS 12455 (W.7)	3 ltr	7	azadirachtin	Alleen toegelaten voor de onbedekte teelt, niet in de bloei! Max. 2 toepassingen, 7 dagen interval, nevenwerking op wantsen en rupsen. <i>Let op met drifteisen. Of met DRT 95, met 4,5 meter teeltvrij of DRT 97,5 bij kleiner dan 4,5 teeltvrij</i>
	Neudosan 16452 (W.1)	10 ltr	—	vetzuren en kaliumzouten	Groen insecticide, alleen toegelaten voor de onbedekte teelt . Maximaal 3 toepassingen met 5 dagen interval. Geen VT.
	Orogaanic 15958 (W.2)	4 liter	1	Sinaasappelolie	Groen middel, alleen bedekte teelt . Maximaal 20 toepassingen met 7 dagen interval. Ook werking op spint, trips en witte vlieg. Tevens een nevenwerking op meeldauw.
	Promanal HP 16278 N (W.-)	10 ltr	—	paraffineoliën	Alle teelten . Toepassen vroege voorjaar, 1 toepassing per jaar toegelaten. <i>Let op met drifteisen. Of met DRT 95, met 4,5 meter teeltvrij of DRT 97,5 bij kleiner dan 4,5 teeltvrij</i>
	Ovitex 16431 N (W.-)	20 ltr (max. 30 ltr)	—	paraffineoliën	Alleen onbedekte teelt . Toepassen vroege voorjaar, 1 toepassing per jaar toegelaten, bij voorkeur de maximale dosering gebruiken. <i>Let op met drifteisen. DRT 95, met 3 meter teeltvrij</i>
Rupsen en bladrollers	Decis Protech 15889 (W.4)	330 ml (max. 400 ml)	7	deltamethrin	Alleen onbedekte teelt . Schadelijk voor natuurlijke vijanden, max 2x per seizoen, met 14 dagen interval. Verboden in de bloei. Toepassen met minimaal 95% DRT
	Xentari WG 12437 (W.4)	1 kg (max. 1,2 kg)	—	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai	Voor optimale werking spuiten bij warm weer op kleine rupsen, eventueel herhalen, maximaal 8 toepassingen, onbedekt 6 dagen interval, bedekt 5 dagen interval

	Turex spuitpoeder <i>11702 (W.4)</i>	1 kg	—	Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai	Voor optimale werking spuiten bij warm weer op kleine rupsen, eventueel herhalen, maximaal 3 toepassingen, onbedekt en bedekt beiden 7 dagen interval
	Dipel DF <i>14674 (W.1)</i>	1 kg	—	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Voor optimale werking spuiten bij warm weer op kleine rupsen, eventueel herhalen, maximaal 8 toepassingen, onbedekt en bedekt beiden 7 dagen interval
	Costar WG <i>15885 (W.1)</i>	0,3 – 1 kg	—	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Voor optimale werking spuiten bij warm weer op kleine rupsen, eventueel herhalen, maximaal 6 toepassingen, onbedekt en bedekt beiden 7 dagen interval
	Florbac <i>15033 (W.2)</i>	1,2 kg	—	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai	Voor optimale werking spuiten bij warm weer op kleine rupsen, eventueel herhalen, maximaal 8 toepassingen, onbedekt 6 dagen interval, bedekt 5 dagen interval
Spintmijten	Vertimec Gold <i>13087 (W.11)</i>	500 ml	28	abamectine	Alleen bedekte teelt. Maximaal 2 toepassingen met 10 dagen interval. Gevaarlijk voor bijen en hommels!!
	Cantack <i>12939 (W.6)</i>	1 liter	—	acequinocyl	Alleen toegelaten middels 1 toepassing na de oogst (BBCH 90-93), daarom ook geen VT
	Scelta <i>13440 (W.8)</i>	1 liter (max. 1,2 liter)	—	cyflumetofen	Alleen toegelaten na de oogst , daarom ook geen VT. Bedekt en onbedekt toegelaten. Maximaal 2 toepassingen met 7 dagen interval.
	Botanigard WP <i>12612 (W.4)</i>	0,625 kg (max. 0,75 kg)	—	Beauveria bassiana	Maximaal 12 toepassingen met een minimaal interval van 5 dagen. Alle teelten toegelaten, werkt ook op trips en witte vlieg
	Botanigard vloeibaar <i>12611 (W.2)</i>	1,25 liter	—	Beauveria bassiana	Maximaal 12 toepassingen met 5 dagen interval. Alleen onbedekte teelt toegelaten , werkt ook op trips en witte vlieg
	Naturalis-L <i>13857 (W.2)</i>	0,75 liter (max. 1 liter)	—	Beauveria bassiana ATCC74040	Groen middel, geen VT. Maximaal 15 toepassingen met 5 dagen interval. Alle teelten toegelaten. Ook werking op trips en witte vlieg
	Lalguard M52 OD <i>14883 (W.1)</i>	1,2 liter	4 uur	Metarhizium anisopliae var. anisopliae stam BIPESCO 5/F52	Bedekte teelt , maximaal 10 toepassingen per 12 maanden met 3 dagen interval en maximaal 1,5 ltr/ha Onbedekte teelt , maximaal 6 toepassingen per 12 maanden met 7 dagen interval en maximaal 1,2 ltr/ha. Nevenwerking op trips en witte vlieg
	Oroganic	4 liter	1	Sinaasappelolie	Groen middel, alleen bedekte teelt . Maximaal 20 toepassingen met 7 dagen interval. Ook werking op trips en witte vlieg. Tevens een nevenwerking op meeldauw.
(Blad-) Galmuggen	Decis Protech	330 ml (max. 400 ml)	7	deltamethrin	Alleen onbedekte teelt. Schadelijk voor natuurlijke vijanden, max 2x per seizoen, met 14 dagen interval. Verboden in de bloei. Toepassen met minimaal 95% DRT
Blad- en mineerwespen	Pirimor	500 gram	3	pirimicarb	Niet toegelaten binnen de bedekte teelt en op percelen welke aan watergangen grenzen.
	Bitterzout (Epso Top)	10 kg	—	magnesium	Het toepassen van deze magnesium bladmeststof heeft effect op de kleine bladwesplarven
Bessenglasvlinder	Decis Protech	330 ml (max. 400 ml)	7	deltamethrin	Alleen onbedekte teelt. Schadelijk voor natuurlijke vijanden, max 2x per seizoen, met 14 dagen interval. Verboden in de bloei. Toepassen met minimaal 95% DRT
Wantsen					Lichte nevenwerking van Sivanto, Neemazal of Botanigard benutten
Kevers	Decis Protech	330 ml (max. 400 ml)	7	deltamethrin	Alleen onbedekte teelt. Schadelijk voor natuurlijke vijanden, max 2x per seizoen, met 14 dagen interval. Verboden in de bloei. Toepassen met minimaal 95% DRT

Taxuskever/ Gegroefde lapsnuitkever	Larvanem	500 miljoen per 1000 m²		Heterorhabditis bacteriophora	Werkzaam tegen de larven en poppen van de taxuskever, echter wel pas bij bodemtemperaturen vanaf 14°C
Witte vlieg	Eradicoat Max	24 ltr	—	maltodextrine	Niet kort voor de oogst toepassen. Werkt ook op dopluizen en cicaden
	Botanigard WP	0,625 kg (max. 0,75 kg)	—	Beauveria bassiana	Maximaal 12 toepassingen met een minimaal interval van 5 dagen. Alle teelten toegelaten, werkt ook op spint en trips
	Botanigard vloeibaar	1,25 liter	—	Beauveria bassiana	Maximaal 12 toepassingen met 5 dagen interval. Alleen onbedekte teelt toegelaten , werkt ook op spint en trips
	Naturalis-L	0,75 liter (max. 1 liter)	—	Beauveria bassiana ATCC74040	Groen middel, geen VT. Maximaal 15 toepassingen met 5 dagen interval. Alle teelten toegelaten. Ook werking op spint en trips
	Futureco Nofly WP 16266 (W.1)	2,5 kg	1	Paecilomyces fumosoroseus stam Fe9901	Alleen toegelaten in de bedekte teelt. Max. 4 toepassingen per seizoen, met 5 dagen interval. Op het etiket staat tegen Witte vlieg en Trips.
	PreFeRal 12694 (W.2)	1 kg (max. 1,5 kg)	—	Isaria fumosorosea Apopka stam 97	Groen schimmelproduct tegen witte vlieg en trips; alleen toegelaten voor de bedekte teelt , niet in de bloei. Max. 12x per seizoen met 7 dagen interval
	Neudosan	10 ltr	—	vetzuren en kaliumzouten	Groen middel, alleen toegelaten voor de onbedekte teelt. Maximaal 3 toepassingen met 5 dagen interval. Geen VT.
	Orogaanic	4 liter	1	Sinaasappelolie	Groen middel, alleen bedekte teelt. Maximaal 20 toepassingen met 7 dagen interval. Ook werking op trips en spint
	Siltac SF (Protac)	0,6 ltr	—	siliconenpolymeren	Het middel heeft geen etiket. De 0,6 liter toepassen in 500 liter water
	Stix	1 – 1,5 ltr	—	siliconenpolymeren	Opletten met bladverbranding, altijd een proefbespuiting uitvoeren, bij voorkeur toepassen met 500 liter per hectare. De maximale dosering is 0,3%.
Trips en cicaden	Decis Protech	330 ml (max. 400 ml)	7	deltamethrin	Alleen onbedekte teelt. Schadelijk voor natuurlijke vijanden, max 2x per seizoen, met 14 dagen interval. Verboden in de bloei. Toepassen met minimaal 95% DRT
	Naturalis-L	1 liter (max. 1,5 liter)	—	Beauveria bassiana ATCC74040	Groen middel, geen VT. Maximaal 15 toepassingen met 5 dagen interval. Ook werking op witte vlieg en spint.
	Orogaanic	4 liter	1	Sinaasappelolie	Groen middel, alleen bedekte teelt. Maximaal 20 toepassingen met 7 dagen interval. Ook werking op spint en witte vlieg
	Tracer 12567 (W.10)	200 ml	3	spinosad	Niet in kiwibes en vlierbes, maximaal 2 toepassingen met een interval van 10 dagen. Tevens werking op rupsen en vliegen. Beste middel tegen de suzuki fruitvlieg! DRT 95 met 4,5 meter teeltvrij of < dan 4,5 meter, dan 97,5 DRT
	Winner 14958 (W.4)	0,3 kg (4x) of 0,6 kg (1x)	—	formetanaat	Alleen toegelaten voor de bedekte teelt als na oogst toepassing tegen trips. Alleen toepasbaar middels automatische spuitapparatuur. Met 0,3 kg per ha 4x toegelaten met 7 dagen interval en 0,6 kg 1x toegelaten
Meeldauw	Stroby WG 11818 (W.5)	200 gram	21	kresoxim-methyl	Alleen onbedekte teelt. Max. 3 toepassingen per jaar met 10 dagen interval.
	Nimrod vloeibaar 6834 (W.15)	1 ltr	7	bupirimaat	Maximaal 4 toepassingen met 12 dagen interval tussen de bespuitingen. Nimrod is alleen toegelaten voor de onbedekte teelt
	Abir 14748 (W.3)	1 ltr	7	bupirimaat	Maximaal 4 toepassingen met 10 dagen interval tussen de bespuitingen. Abir is alleen toegelaten voor de bedekte teelt
	Kumulus S 6147 (W.8)	4 kg	28	spuitzwavel	Alleen toegelaten voor onbedekte teelt , voor o.a. meeldauwbestrijding, maximaal 2 toepassingen per jaar, met 10 dagen interval. Toepassen tot en met de maand mei! Let op met drifteisen! Minimaal 95 DRT bij kleiner dan 450 cm teeltvrij

	Thiovit Jet 5395 (W.8)	4,8 kg	-	spuitzwavel	Alleen toegelaten voor onbedekte teelt , voor o.a. meeldauwbestrijding, maximaal 3 toepassingen per jaar, met 7 dagen interval. Toepassen tot en met de maand juli! Let op met drifteisen! Minimaal 97,5 DRT bij kleiner dan 450 cm teeltvrij
	Microthiol Special Liquid 16371 (W.1)	7,3 ltr	-	spuitzwavel	Alleen toegelaten voor onbedekte teelt , voor o.a. meeldauwbestrijding, maximaal 2 toepassingen per jaar, met 7 dagen interval. Toepassen tot en met de maand juli! Let op met drifteisen! 97,5 DRT met minimaal 300 cm teeltvrij
	Karma 13854 (W.8)	3-4 kg	1	Kaliumwaterstof- carbonaat	Max. 5 toepassingen met een 7 daags interval. Inzet toegelaten vanaf einde bloei. Toepassen op een droog gewas, bij droog weer.
	Fado 14921 (W.4)	2-4 ltr	—	Cos-oga	Voor de onbedekte teelt 8 toepassingen van 2 liter met 8 dagen interval en 3 dagen VT Voor de bedekte teelt 5 toepassingen van max 4 liter met 7 dagen interval en geen VT
	Serenade 14536 (W.11)	5 ltr	—	Bacillus amyloliquefaciens stam QST 713	Biologisch fungicide. Werkt op vruchtrot en nevenwerking op meeldauw. Maximaal 9 toepassingen met een interval van 5 dagen. Toepassen met een uitvloeier of met Flipper
(Nieuwe naam voor Vacciplant)	Iodus 16899 (W.-)	0,75 – 2 ltr	—	laminarin	Voor onbedekte teelt 7 toepassingen van max 2 liter met 7 dagen interval en geen VT Voor de bedekte teelt 7 toepassingen van 0,75 liter met 10 dagen interval en geen VT
Vruchtrot (o.a. Botrytis)	Teldor 12130 (W.9)	1,5 kg	3	fenhexamid	Toegelaten voor vollegrond en de bedekte teelt. Maximaal 4 toepassingen met 10 dagen interval. <i>DRT 90 bij 450 cm teeltvrij of bij < 450 cm teeltvrij, dan DRT 95</i>
	Scala 11555 (W.8)	2 liter	3	Pyrimethanil	Alleen toegelaten voor de onbedekte teelt. Maximaal 2 toepassingen met 10 dagen interval.
	Switch 12819 (W.8)	1 kg	10	cyprodinil en fludioxonil	Alleen toegelaten voor de onbedekte teelt. Breedwerkend schimmelmiddel, (neven)werking tegen Eutypa. Maximaal 3 toepassingen met 10 dagen interval.
	Geoxe (Safir) 14414 N (W.4)	400 gr (max. 500 gr)	7	fludioxonil	Alleen toegelaten voor de onbedekte teelt. Maximaal 2 toepassingen met 10 dagen interval. 1 werkzame stof vanuit de Switch!
	Signum 12630 (W.23)	1,8 kg	3	pyraclostrobin en boscalid	Alleen toegelaten voor de onbedekte teelt. Maximaal twee toepassingen per seizoen met 1,8 kg per hectare met 7 dagen interval. Nevenwerking op meeldauw!
(Laatste jaar)	Luna Sensation 14437 (W.3)	0,6 liter (max. 0,8 liter)	7	Fluopyram en trifloxystrobin	Toegelaten voor vollegrond en de bedekte teelt. Maximaal 2 toepassingen met 7 dagen interval voor de bedekte teelt en 14 dagen interval voor de onbedekte teelt. <i>Toepassen met DRT 95!</i> Uitverkoop 30 januari 2026 en opgebruik 30 juli 2026
	Soriale 15707 (W.4)	1,86 liter	14	kaliumfosfonaten	Toegelaten voor de onbedekte teelt. Maximaal 3 toepassingen met 7 dagen interval. Maximaal 2 toepassingen voor de oogst en 1 toepassing na de oogst
(Nieuw etiket) (Alleen bedekte teelt)	Diverse captan merken, zoals: Merpan spuitkorrel 11462 (W.13) en	1,5 kg (max. 1,8 kg)	7	captan (spuitkorrel)	Alleen toegelaten voor de bedekte teelt! Van bloei tot oogst zijn 6 toepassingen toegelaten. Het interval tussen toepassingen bedraagt 7 dagen.
	Merpan Flowable 12892 (W.7)	2,5 ltr (max. 3 ltr)	7	captan (vloeibaar)	Alleen toegelaten voor de bedekte teelt! Van bloei tot oogst zijn 6 toepassingen toegelaten. Het interval tussen toepassingen bedraagt 7 dagen.
	Serenade 14536 (W.11)	5 ltr	—	Bacillus amyloliquefaciens stam QST 713	Groen fungicide, bruikbaar als bedekkingsfungicide. Maximaal 9 toepassingen met een interval van 5 dagen. Nevenwerking op meeldauw. Toepassen met een uitvloeier.
	Taegro 15794 N (W.4)	370 gram	4 uur	Bacillus amyloliquefaciens stam FzB 24	Groen fungicide, bruikbaar als bedekkingsfungicide. Maximaal 12 toepassingen met een interval van 3 dagen. Nevenwerking op meeldauw.
	Amylo-X WG 16011 N (W.1)	2,5 kg	1	Bacillus amyloliquefaciens subsp. Plantarum D747	Groen fungicide, bruikbaar als bedekkingsfungicide. Maximaal 6 toepassingen met een interval van 7 dagen. Nevenwerking op meeldauw.

	Serifel 15888 (W.4)	0,5 kg	—	Bacillus amyloliquefaciens stam SBI 600	Groen fungicide, bruikbaar als bedekkingsfungicide. Maximaal 10 toepassingen met een interval van 7 dagen.
	Botector 16066 (W.1)	1 kg	1	Aureobasidium pullulans DSM 14940 en 14941	Toegelaten voor vollegrond en de bedekte teelt. Maximaal 6 toepassingen, maar zonder interval. Toepasbaar kort voor de oogst om kleine wondjes af te dekken.
(Nieuwe naam voor Vacciplant)	Iodus	0,75 – 2 ltr	—	laminarin	Voor onbedekte teelt 7 toepassingen van max 2 liter met 7 dagen interval en geen VT Voor de bedekte teelt 7 toepassingen van 0,75 liter met 10 dagen interval en geen VT
	Vintec 15689 (W.5)	0,2 kg	1	Trichoderma atroviride strain SC1	Groen fungicide, toegelaten voor vollegrond en de bedekte teelt. Maximaal 4 toepassingen met 7 dagen interval, daarnaast nog 2x toegelaten tegen taksterfte.
	Polyversum 16162 (W.2)	0,25 kg	—	Pythium oligandrum stam M1	Groen fungicide, alleen toegelaten voor vollegrond. Maximaal 8 toepassingen met 5 dagen interval. Ook 1x in 200 gram per hectare toegelaten als bodemtoepassing middels aangieten.
	Lalstop G46 WG 16694 (W.-)	0,4 kg	—	Clonostachys rosea stam J1446	Toegelaten voor de onbedekte teelt. Maximaal 3 toepassingen tijdens de bloei met 7 dagen interval en geen VT
Taksterfte	Vintec	0,2 kg	—	Trichoderma atroviride strain SC1	Toegelaten alle teelten. Maximaal 2 toepassingen met 7 dagen interval
	Diverse captan merken, zoals: Merpan spuitkorrel en	1,5 kg (max. 1,8 kg)	—	Captan (spuitkorrel)	Na de oogst alle teelten 2 toepassingen en na het snoeien alle teelten 1 toepassing.
	Merpan Flowable	2,5 ltr (max. 3 ltr)	7	captan (vloeibaar)	Na de oogst alle teelten 2 toepassingen en na het snoeien alle teelten 1 toepassing.
Bodemschimmels	Triatum P 12699 (W.2)	15 – 30 gram per 1000 planten	—	trichoderma harzianum Rifai stam T-22	Meegeven middels de bedruppeling, maximaal 5 toepassingen per seizoen, met 70 dagen interval tussen twee behandelingen.
	Triatum G 12841 (W.2)	0,75 kg m ³ (pot)grond	—	trichoderma harzianum Rifai stam T-22	Plantversterker tegen bodemziekten, vroeg in (bijvoorbeeld) opkweek inzetten, optie is 1 kg op 1000 planten te gebruiken als plantgatbehandeling
	Asperello T34 Biocontrol 15212 (W.2)	10 gram m ³ (pot)grond of 5 kg	—	trichoderma asperellum stam T34	Meegeven middels aangieten of bedruppeling, maximaal 2 toepassingen per seizoen, met 7 dagen interval tussen twee behandelingen. Dan 2 x 5 gram per m ³ potgrond of 2 x 2,5 kg per hectare.
	Polyversum	0,2 kg	—	Pythium oligandrum stam M1	1x in 200 gram per hectare toegelaten als bodemtoepassing middels aangieten.
Onkruidbestrijding:	Agil 100 EC 15291 (W.3)	0,75 – 1,5 ltr/ ha	30	propaquizafob	Alleen onbedekte teelt, maximaal 1,5 liter per hectare per jaar toepassen
	AZ 500 15264 (W.3)	0,5 ltr	100	isoxaben	Na-oogst/wintertoepassing, werkt het best bij lage temperatuur. 1 toepassing per jaar is toegelaten. Niet in grondwaterbeschermingsgebieden
	Quickdown 13246 (W.5)	0,8 ltr	—	pyraflufen-ethyl	Alleen toegelaten binnen de onbedekte teelt. Maximaal 2 toepassingen per seizoen, met 21 dagen interval. Voeg bij de toepassing 1 liter Minerale- of onkruidolie per hectare toe.
	Kerb Flo 13152 (W.4)	2,5 ltr	—	propyzamide	Na-oogst/wintertoepassing, werkt het best bij lage temperatuur
	Devrinol 45 SC 14282 (W.3)	2,7 ltr	—	napropamide	Maximaal 1 toepassing per seizoen. Niet toegelaten in percelen waar grasbanen aanwezig zijn!

	Wing P 14881 (W.3)	3 ltr	–	Dimethenamide-P en pendimethalin	Alleen toegelaten voor de onbedekte teelt, maximaal 1 toepassing per seizoen. Niet toegelaten in percelen waar grasbanen aanwezig zijn!
--	-----------------------	-------	---	-------------------------------------	--

Opmerkingen:

- B* = beperkingen op etiket ten aanzien van gebruik langs bijvoorbeeld watergangen, moment van toepassing, maximale dosering, etc.
Lees voor gebruik het etiket of overleg met uw voorlichter
- VT* = veiligheidstermijn in dagen, (tussen haakjes staat de veiligheidstermijn binnen de bedekte teelt)
- Let met name bij Pirimor op met het zogenaamde “Re- entry”. Voor alle andere middelen geldt pas weer in het gewas aan het werk, nadat het gewas is opgedroogd. Bij gebruik in kassen geldt, voor bijna alle middelen, eerst twee uur ventileren en vervolgens mag de ruimte weer betreden worden.
(Zie voor etiketten: www.fytostat.nl of www.ctgb.nl, of overleg met uw voorlichter)
- **Binnen een geïntegreerde teelt zoveel mogelijk selectieve middelen inzetten, met geen of weinig effect op natuurlijke vijanden.**
- In beschermde teelten is het uitzetten van natuurlijke vijanden een goede optie.