

Toelatingen in de teelt van frambozen

De onderstaande gegevens zijn zorgvuldig samengesteld (februari 2026). De opsteller is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onvolledigheden. Raadpleeg voor gebruik altijd de meest recente etikettekst (www.ctgb.nl) of uw voorlichter. Let op beperkingen in gebruik van middelen (o.a. langs watergangen, aantal bespuitingen, etc.)

TOELATINGEN IN DE TEELT VAN FRAMBOZEN 2026

Plaag/ziekte	Middelen	Dosering/ ha	V.T.	Werkzame stof	Re-entry	Opmerkingen	
Kevers o.a. Aardbeibloesemkever en frambozenkever	Decis Protech 15889	330 ml (max. 400 ml)	7	deltamethrin		Alleen onbedekte teelt. Schadelijk voor natuurlijke vijanden, max 2x per seizoen, met 14 dagen interval. Verboden in de bloei. Toepassen met minimaal 95% DRT	B
Bladluizen	Pirimor 5794	500 gram	3	pirimicarb	R1	Niet toegelaten binnen de bedekte teelt en niet op percelen welke aan watergangen grenzen. Max. 2 toepassingen met een interval van 14 dagen Uitverkoop 15 september 2026 en opgebruik 31 december 2026	B
	Teppeki 12757	140 gram	3	flonicamid		Alleen toegelaten onbedekte teelt , maximaal 2 toepassingen met 7 dagen interval. Niet in de bloei! In de bloei alleen toepassen tussen zonsondergang en zonsopkomst.	B
	Afinto 16104	140 gram	3	flonicamid		Alleen toegelaten onbedekte teelt , maximaal 2 toepassingen met 7 dagen interval. Niet in de bloei! In de bloei alleen toepassen tussen zonsondergang en zonsopkomst.	B
	Sivanto Prime 15598	0,3 – 1 ltr	3	flupyradifurone		0,3 ltr: Toegelaten voor de onbedekte teelt. Max. 1 toepassing per 12 maanden. 1 ltr: Alleen toegelaten in de bedekte teelt op substraat. Max. 2 toepassingen per 12 maanden met 10 dagen interval. Nevenwerking op kevers en wantsen.	B
	ER II 15175	25 ltr	–	maltodextrine		Niet kort voor de oogst toepassen. Werkt ook goed op witte vlieg en cicaden	
	Eradicoat Max 16056	20 ltr (max. 24 ltr)	–	maltodextrine		Bedekte teelt: 40 toepassingen met 3 dagen interval Onbedekte teelt: 5 toepassingen met 3 dagen interval	
	NeemAzal-TS 12455	3 ltr	7	azadirachtin		Alleen toegelaten voor de onbedekte teelt, niet in de bloei! Max. 2x met 7 dagen interval, nevenwerking op wantsen en rupsen. <i>Let op met drifteisen. Of met DRT 95, met 4,5 meter teeltvrij of DRT 97,5 bij < dan 4,5 teeltvrij</i>	B
	Ovitex 16431	20 ltr (max. 30 ltr)	–	paraffineoliën		Alleen onbedekte teelt. Toepassen vroege voorjaar, 1 toepassing per jaar toegelaten, bij voorkeur de maximale dosering gebruiken. <i>Let op met drifteisen. DRT 95, met 3 meter teeltvrij</i>	
Rupsen	Decis Protech 15889	330 ml (max. 400 ml)	7	deltamethrin		Alleen onbedekte teelt. Schadelijk voor natuurlijke vijanden, max 2x per seizoen, met 14 dagen interval. Verboden in de bloei. Toepassen met minimaal 95% DRT	B
	Xentari WG 12437	1 kg (max. 1,2 kg)	-	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai		Voor optimale werking spuiten bij warm weer op kleine rupsen, eventueel herhalen, maximaal 8 toepassingen, onbedekt 6 dagen interval, bedekt 5 dagen interval	
	Turex 11702	1 kg		Bacillus thuringiensis subsp. aizawai		voor optimale werking spuiten bij warm weer op kleine rupsen, eventueel herhalen, maximaal 3 toepassingen, onbedekt en bedekt beiden 7 dagen interval	
	Dipel DF 14674	1 kg	-	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki		Voor optimale werking spuiten bij warm weer op kleine rupsen, eventueel herhalen, maximaal 8 toepassingen, onbedekt en bedekt beiden 7 dagen interval	
	Costar WG 15885	0,3 – 1 kg	–	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki		Voor optimale werking spuiten bij warm weer op kleine rupsen, eventueel herhalen, maximaal 6 toepassingen, onbedekt en bedekt beiden 7 dagen interval	

	Florbac 15033	1,2 kg	–	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai	Voor optimale werking spuiten bij warm weer op kleine rupsen, eventueel herhalen, maximaal 8 toepassingen, onbedekt 6 dagen interval, bedekt 5 dagen interval	
Spint- en galmijten	Vertimec Gold 13087	500 ml	3	abamectine	Alleen bedekte teelt. Maximaal 2 toepassingen met 14 dagen interval. Gevaarlijk voor bijen en hommels!!	
	Cantack 12939	1 liter	-	Acequinocyl	Alleen toegelaten middels 1 toepassing na de oogst (BBCH 90-93), daarom ook geen VT	B
	Scelta 13440	1 liter (max. 1,2 liter)	-	cyflumetofen	Alleen toegelaten na de oogst , daarom ook geen VT. Bedekt en onbedekt toegelaten. Maximaal 2 toepassingen met 7 dagen interval.	B
	Botanigard WP 12612	0,625 kg (max. 0,75 kg)	-	Beauveria bassiana	Maximaal 12 toepassingen met een minimaal interval van 5 dagen. Alle teelten toegelaten, werkt ook op trips en witte vlieg	
	Botanigard vlb. 12612	1,25 liter	-	Beauveria bassiana	Maximaal 12 toepassingen met 5 dagen interval. Alleen onbedekte teelt toegelaten , werkt ook op trips en witte vlieg	
	Naturalis-L 13857	0,75 liter (max. 1 liter)	-	Beauveria bassiana ATCC74040	Groen middel, geen VT. Maximaal 15 toepassingen met 5 dagen interval. Bij voorkeur toepassen met uitvloeier Heliosol of Helioterpen film. Ook werking op witte vlieg en trips.	
	Lalguard M52 OD 14883	1,25 liter (max 1,5 liter)	4 uur	Metarhizium anisopliae var. anisopliae stam BIPESCO 5/F52	Bedekte teelt , maximaal 10 toepassingen per 12 maanden met 3 dagen interval en maximaal 1,5 ltr/ha. Onbedekte teelt , maximaal 6 toepassingen per 12 maanden met 7 dagen interval en maximaal 1,25 ltr/ha. Werkt ook op trips en witte vlieg.	
	Oroganic 15958	4 liter	1	Sinaasappelolie	Groen middel, alleen bedekte teelt . Maximaal 20 toepassingen met 7 dagen interval. Ook werking op trips en witte vlieg	
Bladgalmuggen	Decis Protech 15889	330 ml (max. 400 ml)	7	deltamethrin	Alleen onbedekte teelt. Schadelijk voor natuurlijke vijanden, max 2x per seizoen, met 14 dagen interval. Verboden in de bloei. Toepassen met minimaal 95% DRT	B
Frambozenschors-galmug	Decis Protech 15889	330 ml (max. 400 ml)	7	deltamethrin	Alleen onbedekte teelt. Schadelijk voor natuurlijke vijanden, max 2x per seizoen, met 14 dagen interval. Verboden in de bloei. Toepassen met minimaal 95% DRT	B
	Larvanem	500 miljoen per 1000 m²	–	Heterorhabditis bacteriophora	Toepassen op een vochtige bodem en deze ook vochtig houden. Aaltjes bij voorkeur in de bovenste 1 a 2 cm teeltaarde houden	
	Compost	-	–		- Afdekken van de zwartstrook in het voorjaar met circa 5 cm fijne compost.	
Wantsen					Nevenwerking van Sivanto, Neemazal en Botanigard benutten	
Taxuskever/ Gegroefde lapsnuitkever	Larvanem	500 miljoen per 1000 m²		Heterorhabditis bacteriophora	Werkzaam tegen de larven en poppen van de taxuskever, echter wel pas bij bodemtemperaturen vanaf 14°C	
Suzuki Fruitvlieg	Tracer 12567	200 ml	3	spinosad	Alleen onbedekte teelt, maximaal 2 toepassingen met een interval van 10 dagen. Tevens werking op rupsen en vliegen. Beste middel tegen de suzuki fruitvlieg!	B
Witte vlieg	ER II of Eradicoat Max	25 of 24 ltr	–	maltodextrine	Tevens werking op trips en spint	
	Botanigard WP 12612	0,75 kg	–	Beauveria bassiana	Maximaal 5 toepassingen met een minimaal interval van 5 dagen. Alle teelten toegelaten, werkt ook op trips	
	Futureco Nofly WP 16266	2,5 kg	1	Paecilomyces fumosoroseus stam Fe9901	Alleen toegelaten in de bedekte teelt. Max. 4 toepassingen per seizoen, met 5 dagen interval. Op het etiket staat tegen Witte vlieg en Trips.	

	PreFeRal 12694	1 kg (max. 1,5 kg)	–	Isaria fumosorosea Apopka stam 97	Biologisch schimmelproduct tegen witte vlieg en trips; alleen toegelaten voor de bedekte teelt, niet in de bloei. Max. 12x per seizoen met 7 dagen interval	
	Sivanto Prime	0,6 ltr	3	flupyradifurone	Alleen toegelaten in de bedekte teelt op substraat. Max. 2 toepassingen met 10 dagen interval.	
	Oroganic 15958	4 liter	1	Sinaasappelolie	Groen middel, alleen bedekte teelt. Maximaal 20 toepassingen met 7 dagen interval. Ook werking op trips en witte vlieg	
	Siltac SF	0,6 ltr	–	siliconenpolymeren	Het middel heeft geen etiket. De 0,6 liter toepassen in 500 liter water	
	Stix	1 – 1,5 ltr	–	siliconenpolymeren	Opletten met bladverbranding, altijd een proefbespuiting uitvoeren, bij voorkeur toepassen met 500 liter per hectare. De maximale dosering is 0,3%.	
Trips en cicaden	Decis Protech 15889	330 ml (max. 400 ml)	7	deltamethrin	Alleen onbedekte teelt. Schadelijk voor natuurlijke vijanden, max 2x per seizoen, met 14 dagen interval. Verboden in de bloei. Toepassen met minimaal 95% DRT	
	Tracer 12567	200 ml	3	spinosad	Alleen onbedekte teelt, maximaal 2 toepassingen met een interval van 10 dagen. Tevens werking op rupsen en vliegen. Beste middel tegen de suzuki fruitvlieg!	
	Winner 14958	0,3 kg (4x) of 0,6 kg (1x)	–	formetanaat	Alleen toegelaten voor de bedekte teelt als na oogst toepassing tegen trips. Alleen toepasbaar middels automatische spuitapparatuur. Met 0,3 kg per ha 4x toegelaten met 7 dagen interval en 0,6 kg 1x toegelaten	
	Oroganic 15958	4 liter	1	sinaasappelolie	Groen middel, alleen bedekte teelt. Maximaal 20 toepassingen met 7 dagen interval. Ook werking op trips en witte vlieg	
Meeldauw en roest	Signum 12630	1,8 kg	3	Pyraclostrobin en boscalid	Maximaal twee toepassingen per seizoen. (Neven)werking op stengelziekten! Niet toegelaten binnen de bedekte teelt.	B
	Amistar 11767	1 ltr	7	Azoxystrobin	Maximaal 2 toepassingen per 12 maanden met 7 dagen interval en alle teelten. Minimaal DRT 90 en 450 cm teeltvrij	B
	Karma 13854	3-4 kg	1	Kaliumwaterstof-carbonaat	Max. 5 toepassingen. Inzet toegelaten vanaf einde bloei.	
	Serenade 14536	5 ltr	–	Bacillus amyloliquefaciens stam QST 713	Bio. fungicide, bruikbaar als bedekkingsfungicide. Maximaal 9 toepassingen met een interval van 5 dagen. Ook toepasbaar tegen vruchtrot. Toepassen met een uitvloeier!	
(Nieuwe naam voor Vacciplant)	Iodus 16899	0,75 – 2 ltr	–	laminarin	Voor onbedekte teelt 7 toep. van max 2 liter met 7 dagen interval en geen VT Voor de bedekte teelt 7 toep. van 0,75 liter met 10 dagen interval en geen VT	
	Fado 14921	4 ltr/ ha	–	Cos-oga	Alleen bedekte teelt , max 5 toepassingen per teeltseizoen, toepassen met uitvloeier, bij voorkeur HiWet	
	Nimrod vloeibaar 6834	1 ltr	7	bupirimaat	Maximaal 4 toepassingen met 12 dagen interval tussen de bespuitingen. Nimrod is alleen toegelaten voor de onbedekte teelt	B
	Abir 14748	1 ltr	7	bupirimaat	Maximaal 4 toepassingen met 10 dagen interval tussen de bespuitingen. Abir is alleen toegelaten voor de bedekte teelt	
Vruchtrot (o.a. Botrytis)	Teldor 12130	1,5 kg	7	fenhexamid	Alleen toegelaten voor de onbedekte teelt. Maximaal 4 toepassingen met 10 dagen interval	B
	Diverse captan spk. Merken of Captan Vloeibaar	1,5 kg (max. 1,8 kg) of 2,5 ltr (max. 3 ltr)	7	captan	Voor vruchtrot alleen in de bedekte teelt toegelaten , dan 6 toepassingen met 7 dagen interval. Na de oogst alle teelten 3 toepassingen tegen o.a. stengelziekten.	
	Switch 12819	1 kg	10	cyprodinil en fludioxonil	Breedwerkend schimmelmiddel, ook (neven)werking tegen stengelziekten Maximaal 3 toepassingen per seizoen. Alle teelten!!	B

	Geoxe (Safir) <i>14414</i>	400 gr (max. 500 gr)	7	fludioxonil	Alleen toegelaten voor de onbedekte teelt. Maximaal 2 toepassingen met 10 dagen interval. 1 werkzame stof vanuit de Switch!	B
	Signum <i>12630</i>	1,8 kg	3	Pyraclostrobin en boscalid	Maximaal twee toepassingen per seizoen. (Neven)werking op meeldauw, roest en stengelziekten! Niet toegelaten binnen de bedekte teelt.	B
	Amistar <i>11767</i>	1 ltr	7	Azoxystrobin	Maximaal 2 toepassingen per 12 maanden met 7 dagen interval en alle teelten. Minimaal DRT 90 en 450 cm teeltvrij	B
	Scala <i>11555</i>	2 ltr	3	Pyrimethanil	Maximaal 2 toepassingen per 12 maanden met 7 dagen interval, uitsluitend onbedekte teelt	B
	Pyrus 400 SC <i>14810</i>	2 ltr	7	Pyrimethanil	Maximaal 2 toepassingen per 12 maanden met 7 dagen interval, uitsluitend onbedekte teelt	B
	Serenade <i>14536</i>	5 ltr	–	Bacillus amyloliquefaciens stam QST 713	Biologisch fungicide, bruikbaar als bedekkingsfungicide. Maximaal 9 toepassingen met een interval van 5 dagen. Toepassen met een uitvloeier.	
	Taegro <i>15794</i>	370 gram	4 uur	Bacillus amyloliquefaciens stam FzB 24	Biologisch fungicide, bruikbaar als bedekkingsfungicide. Maximaal 12 toepassingen met een interval van 3 dagen. Nevenwerking op meeldauw.	
	Amylo-X WG <i>16011 N</i>	2,5 kg	1	Bacillus amyloliquefaciens subsp. Plantarum D747	Biologisch fungicide, bruikbaar als bedekkingsfungicide. Maximaal 6 toepassingen met een interval van 7 dagen. Nevenwerking op meeldauw.	
	Serifel <i>15888</i>	0,5 kg		Bacillus amyloliquefaciens stam SBI 600	Biologisch fungicide, alleen toegelaten voor de bedekte teelt. Maximaal 6 toepassingen met een interval van 5 dagen.	
	Luna Sensation <i>14437</i>	0,6 liter (max. 0,8 liter)	3	Fluopyram en trifloxystrobin	Toegelaten voor vollegrond en de bedekte teelt. Maximaal 2 toepassingen met 7 dagen interval voor de bedekte teelt en 21 dagen interval voor de onbedekte teelt Uitverkoop 30 januari 2026 en opgebruik 30 juli 2026	B
	Botector <i>16066</i>	1 kg	1	Aureobasidium pullulans DSM 14940 en 14941	Toegelaten voor vollegrond en de bedekte teelt. Maximaal 6 toepassingen, maar zonder interval. Toepasbaar kort voor de oogst om kleine wondjes af te dekken	
(Nieuwe naam voor Vacciplant)	Iodus <i>16899</i>	0,75 – 2 ltr	–	laminarin	Voor onbedekte teelt 7 toep. van max 2 liter met 7 dagen interval en geen VT Voor de bedekte teelt 7 toep. van 0,75 liter met 10 dagen interval en geen VT	
	Vintec <i>15689</i>	0,2 kg	1	Trichoderma atroviride strain SC1	Biologisch fungicide, toegelaten voor vollegrond en de bedekte teelt. Maximaal 4 toepassingen met 7 dagen interval, daarnaast nog 2x toegelaten tegen scheutsterfte.	
	Polyversum <i>16162</i>	0,25 kg	–	Pythium oligandrum stam M1	Biologisch fungicide, alleen toegelaten voor vollegrond. Maximaal 8 toepassingen met 5 dagen interval. Ook 1x in 200 gram per hectare toegelaten als bodemtoepassing middels aangieten.	
	Lalstop G46 WG <i>16694</i>	0,3 – 0,4 kg	–	Clonostachys rosea stam J1446	Onbedekt is 3 toepassingen tijdens de bloei met 0,4 kg/ha en 7 dagen interval Walk in tunnel is 3 toepassingen tijdens de bloei met 0,3 kg/ha en 7 dagen interval	
Bodemschimmels	Trianum P <i>12699</i>	15–30 gram per 1000 planten	–	trichoderma	Meegeven middels de bedruppeling, maximaal 5 toepassingen per seizoen, met 70 dagen interval tussen twee behandelingen.	
	Trianum G <i>12841</i>	0,75 kg m ³ (pot)grond	–	trichoderma	Plantversterker tegen bodemziekten, vroeg in (bijvoorbeeld) opkweek inzetten, optie is 1 kg op 1000 planten te gebruiken als plantgatbehandeling	
	Polyversum <i>16162</i>	0,25 kg	–	Pythium oligandrum stam M1	1x in 200 gram per hectare toegelaten als bodemtoepassing middels aangieten.	
	Lalstop G46 WG <i>16694</i>	25 – 30 gr per 1000 planten	–	Clonostachys rosea stam J1446	Onbedekt is 30 gram per 1000 planten als aangiet of bedruppeling Bedekt is 25 gram per 1000 planten als aangiet of bedruppeling	
	Asperello T34 Biocontrol <i>15212</i>	10 gram m ³ (pot)grond of 5 kg	–	trichoderma asperellum stam T34	Meegeven middels aangieten of bedruppeling, maximaal 2 toepassingen per seizoen, met 7 dagen interval tussen twee behandelingen. Dan 2 x 5 gram per m3 potgrond of 2 x 2,5 kg per hectare.	

Stengelziekten	Vintec	0,2 kg	-	Trichoderma atroviride strain SC1	Maximaal 2 toepassingen met 7 dagen interval.	
	Diverse captan merken:	1,5 kg (max. 1,8 kg)	–	Captan (spuitkorrel)	Na de oogst alle teelten 3 toepassingen met 7 dagen interval.	B
		2,5 ltr (max. 3 ltr)	–	captan (vloeibaar)	Na de oogst alle teelten 3 toepassingen met 7 dagen interval.	B
Onkruidbestrijding:	Agil 100 EC 15291	0,75 – 1,5 ltr/ha	30	propaquizafob	Alleen onbedekte teelt, maximaal 1,5 liter per hectare per jaar toepassen	
	AZ 500 15264	0,5 ltr	100	isoxaben	Na-oogst/wintertoepassing, werkt het best bij lage temperatuur. 1 toepassing per jaar is toegelaten. Niet in grondwaterbeschermingsgebieden	
	Quickdown 13246	0,8 ltr	-	pyraflufen-ethyl	Alleen toegelaten voor de onbedekte teelt. Max. 2 keer per seizoen, met 21 dagen interval. Voeg altijd 1 liter Minerale- of onkruidolie per hectare toe.	
	Kerb Flo 13152	2,5 ltr	-	propyzamide	Na-oogst/wintertoepassing, werkt het best bij lage temperatuur	
	Devrinol 45 SC 14282	2,7 ltr	-	napropamide	Maximaal 1 toepassing per seizoen. Niet toegelaten in percelen waar grasbanen aanwezig zijn!	
	Wing P 14881	3 ltr	-	Dimethenamide-P en pendimethalin	Alleen toegelaten voor de onbedekte teelt, maximaal 1 toepassing per seizoen. Niet toegelaten in percelen waar grasbanen aanwezig zijn!	

Opmerkingen:

- B* = beperkingen op etiket ten aanzien van gebruik langs bijvoorbeeld watergangen, moment van toepassing, maximale dosering, etc. Lees voor gebruik het etiket of overleg met uw voorlichter
 - VT* = veiligheidstermijn in dagen. (Tussen haakjes staat het veiligheidstermijn voor de bedekte teelt (kassen en tunnels) vermeld)
 - (R1) Let bij het middel Pirimor op met het zogenaamde “Re- entry”. Voor dit middel geldt dat na een toepassing tot 14 dagen lang uitsluitend in het gewas mag worden gewerkt met beschermende kleding. Dit houdt in het dragen van lange mouwen, een lange broek en het dragen van handschoenen. Voor alle andere middelen geldt pas weer in het gewas aan het werk, nadat het gewas is opgedroogd. Bij gebruik in kassen geldt, voor bijna alle middelen, eerst twee uur ventileren en vervolgens mag de ruimte weer betreden worden. (Zie voor etiketten: www.fytostat.nl of www.ctgb.nl, of overleg met uw voorlichter)
 - Binnen een geïntegreerde teelt zoveel mogelijk selectieve middelen inzetten, met geen of weinig effect op natuurlijke vijanden.
 - In beschermde teelten is het uitzetten van natuurlijke vijanden een goede optie.
- Voor meer informatie omtrent eventuele biologische bestrijding neem contact op met AR Plant of CAF